

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
0.025W/Vアザミトール水	0.025%10mL	ベンザルコニウム塩化物	外				室温
1%ティブリバン注・キット	500mg50mL1筒	プロボフォール	注	先発品	劇		凍結を避けて25°C以下で保存
25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン	内	準先発			室温
2mgセルシン錠	2mg1錠	ジーゼバム	内	準先発	向		室温
D-ソルビトール経口液75%「コーウ」	75%10mL	D-ソルビトール	内		処		室温
KCL注20mEqキット「テルモ」	1モル20mL1キット	塩化カリウム	注	後発品	処		室温,遮光
KCL補正液1mEq/mL	1モル20mL1管	塩化カリウム	注		処		室温
LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1管	ゴナドレリン酢酸塩	注	先発品	処		室温
L-ケフレクス颗粒	500mg1g	セファレキシン	内	先発品	処		室温
MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
MSコンチン錠60mg	60mg1錠	モルヒネ硫酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
MS温シップ「タイホウ」	10g	バッブ剤	外	後発品			室温
MS冷シップ「タイホウ」	10g	バッブ剤	外	後発品			室温
PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL	ポリビニルアルコールヨウ素	外				冷所
アーテン錠(2mg)	2mg1錠	トリヘキシフェニジル塩酸塩	内		処		室温
アートセラピス脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	ブドウ糖・無機塩類配合剤	注	先発品	処		室温
アーピタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	セツキシマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
アイオビジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	アブラクロニジン塩酸塩	外	先発品	劇		室温
アイセントレス錠400mg	400mg1錠	ラルテグラビルカリウム	内	先発品	劇		室温
アイビーディドライロップ5%	5%1g	スプラタストトル酸塩	内	先発品			室温
アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL1筒	アフリベルセプト(遺伝子組換え)	注	先発○	劇	生物	冷所
アキネント錠1mg	1mg1錠	ビペリデン塩酸塩	内		処		室温
アクテムラ点滴静注用400mg	400mg20mL1瓶	トリシリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇	生物	冷所
アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	トリシリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇	生物	冷所
アクトシン軟膏3%	3%1g	ブクラデシントナリウム	外	先発品			冷所
アクトヒト【2回目以降】[冷所]	10μg1瓶(溶解液付)	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(担体たん白質)	注		劇	生物	2~8°Cに保存
アクトヒト【初回】[冷所]	10μg1瓶(溶解液付)	乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(担体たん白質)	注		劇	生物	2~8°Cに保存
アクプラ静注用100mg	100mg1瓶	ネダプラチナ	注	先発品	毒		室温
アクプラ静注用50mg	50mg1瓶	ネダプラチナ	注	先発品	毒		室温
アクメイD輸液	500mL1瓶	酔酸リングル液(ブドウ糖加)	注		処		室温
アクロマイシン軟膏3%	30mg1g	トララサイクリン塩酸塩	外		処		室温
アクロマイシン末	1g	トララサイクリン塩酸塩	外		処		室温
アコアラン静注用600	600国際単位1瓶(溶解液付)	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	室温
アシクロビル眼軟膏3%「日点」	3%1g	アシクロビル	外				室温
アシクロビル点滴静注液250mg「トーウ」	250mg1管	アシクロビル	注	★	処		室温
アジルサターンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	アジルサルタン	内	後発品	処		室温
アズノールうがい液4%	4%1mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	外	後発品			室温
アズノール軟膏0.033%	0.033%10g	ジメチルイソプロピルアゼレン	外				室温
アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	L-アスパラギン酸カリウム	内				室温
アスパラカリウム注10mEq	17.12%10mL1管	L-アスパラギン酸カリウム	注		処		室温
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	17.12%10mL1キット	L-アスパラギン酸カリウム	注	後発品	処		室温,遮光
アスピリント【原末】「マルイシ」	10g	アスピリン	内				室温
アスピール液(0.5%)	0.5%1mL	d-イソプレナリン塩酸塩	外				室温,遮光
アスペリシロップ0.5%	0.5%10mL	テベビジンヒベンズ酸塩	内				室温
アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%1mL	アセチルシスティン	内	先発品			室温
アセトアソノフェン「GJ」原末	1g	アセトアミノフェン	内		劇		室温
アセトアソノフェン坐剤小児用100mg「NIG」	100mg1個	アセトアミノフェン	外	後発品			室温
アセトアソノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200mg1個	アセトアミノフェン	外	後発品			室温
アセトアソノフェン錠200mg「マルイシ」	200mg1錠	アセトアミノフェン	内	後発品			室温
アセリオ静注液1000mgパック	1,000mg100mL1袋	アセトアミノフェン	注	先発品	劇		室温
アゼルジビン錠8mg「ケミファ」	8mg1錠	アゼルジビン	内	後発品	処		室温
アダブチノール錠5mg	5mg1錠	ヘレニエニン	内				室温
アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1カプセル	ヒドロキシソルビ酸塩	内	準先発	処		室温
アタラックス-P注射液(25mg/mL)	2.5%1mL管	ヒドロキシジン塩酸塩	注		処		室温
アダリムマブB5皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」	40mg0.4mL1筒	アダリムマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇	生物	冷所
アテノロール錠25mg「トーウ」	25mg1錠	アテノロール	内	後発品	処		室温
アデホスリニー1号40mg	40mg1管	アデノシンリニン酸ナトリウム水和物	注		処		冷所
アデホスコワーフ顆粒10%	10%1g	アデノシンリニン酸ナトリウム水和物	内				室温
アドエア500ディスクス60吸入用	60プリスター1キット	サルメテロールキナホ酸塩・フルチカゾン	外	先発品	処		室温
アドナ錠30mg	30mg1錠	カルバクロムスルホン酸ナトリウム水和物	内	準先発			室温
アトニン-O5単位	5単位1管	オキシトシン	注				冷所
アドフィードバッブ40mg	10cm×14cm1枚	フルルビロフエン	外	先発品			室温
アトルバタシンOD錠5mg「トーウ」	5mg1錠	アトルバタシンカルシウム水和物	内	後発品	処		室温
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1筒	アドレナリン	注		劇		室温
アトロビン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒	アトロビン硫酸塩水和物	注	後発品	劇		室温,遮光
アナストロゾール錠1mg「トーウ」	1mg1錠	アナストロゾール	内	後発品	劇		室温
アナフリニール錠25mg	25mg1錠	クロミブランジン塩酸塩	内	先発品	処		室温
アナベイン注2mg/mL	0.2%100mL1袋	ロビパカイン塩酸塩水和物	注	先発○	劇		室温
アネメトロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	メトロニダゾール	注	先発品			室温
アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100mg4mL1瓶	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇	生物	冷所
アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400mg16mL1瓶	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇	生物	冷所
アフタッキ口腔用貼付剤25μg	25 μg1錠	トリアムシロノンアセトニド	外	先発品			室温
アブラサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	注	先発品	毒	特生	室温
アブリヌガ前服用(冷所)	(0.12mg)1瓶(溶解液付)	組換えRSウイルスワクチン	注		劇	生物	2~8°C
アブレピタントカプセル125mg「サワイ」	125mg1カプセル	アブレピタント	内	後発品	処		室温
アブレピタントカプセル80mg「サワイ」	80mg1カプセル	アブレピタント	内	後発品	処		室温
アブレピタントカプセルセット「サワイ」	1セット	アブレピタント	内	後発品	処		室温
アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50mg1錠	アマンタジン塩酸塩	内	後発品	処		室温
アミオダロン塩酸塩注50mg「TE」	150mg3mL1管	アミオダロン塩酸塩	注	後発品	劇		室温
アミオダロン塩酸塩崩解50mg「TE」	50mg1錠	アミオダロン塩酸塩	内	後発品	毒		室温
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SWJ」	100mg1管	アミカシン硫酸塩	注		処		室温
アミサリン注100mg	10%1mL1管	プロカインアミド塩酸塩	注		処		室温
アミティーザカプセル24μg	24 μg1カプセル	ルビロストン	内	先発品	処		室温
アミノレバシEN結合散	10g	肝不全用成分糞便剤	内	先発品			室温
アミノレバシン点滴静注	500mL1袋	肝不全用アミノ酸製剤	注	先発品	処		室温
アミババーム点滴静注用50mg	200mL1袋	高カロリー輸液液用総合アミノ酸製剤	注	先発品	処		室温
アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	アムホテリシンB	注	先発品	毒		凍結を避けて25°C以下で保存
アムロジンOD錠2.5mg「トーウ」	2.5mg1錠	アムロジンベニル酸塩	内	後発品	劇		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
アムロジンOD錠5mg「トーア」	5mg1錠	アムロジビンペニル酸塩	内	後発品	劇処		室温
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	10mg1錠	アメジニウムメチル硫酸塩	内	後発品			室温
アモキシリンカプセル250mg「トーア」	250mg1カプセル	アモキシリン水和物	内		処		室温
アラベル内用剤1.5g	1.5g1瓶	アミノレブリン酸塩酸塩	内	先発品	処		室温
アリナシンF50注	50mg20mL1管	フルスルチアミン塩酸塩	注		処		室温
アリナシン注射液10mg	10mg1管	フルスルチアミン	注		処		室温
アリピラゾール錠6mg「ニプロ」	6mg1錠	アリピラゾール	内	後発品	劇処		室温
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	10mg20mL1管	アルガトロバン水和物	注	後発品	処		室温
アルスマチック関節手術用灌流液	3L1袋	乳酸リゲル液	外	先発品	処		室温
アルダクトンA細粒10%	10%1g	スピロノラクトン	内		処		室温
アルドコット錠250	250mg1錠	メチルドバ水和物	内		処		室温
アルト原末	500mg1管	アルギン酸ナトリウム	外		処		室温
アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーア」	0.25μg1カプセル	アルファカルシドール	内	後発品	劇		室温
アルファカルシドールカプセル1μg「トーア」	1μg1カプセル	アルファカルシドール	内	後発品	劇		室温
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.5μg1錠	アルファカルシドール	内	後発品	劇		室温
アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg1mL	アルファカルシドール	内	先発品	劇		室温
アルブジラム錠0.4mg「トーア」	0.4mg1錠	アルブジラム	内	後発品	向処		室温
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶	アルプロスタジルアルファデクス	注	後発品	劇処		室温
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg1瓶	アルプロスタジルアルファデクス	注	後発品	劇処		室温
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	10μg2mL1管	アルプロスタジル	注	後発品	劇処		冷所
アルロイドG内用液5%	10mL	アルギン酸ナトリウム	内				室温
アレビアチン散10%	10%1g	フェニトイ	内		劇処		室温
アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイ	内		処		室温
アレンドロン酸錠35mg「トーア」	35mg1錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物	内	後発品	劇処		室温
アローゼン顆粒	1g	センナ・センナ実	内				室温
アロキラ静注0.75mg	0.75mg5mL1瓶	バロノセトロン塩酸塩	注	先発○	劇処		室温
アロキシ点滴静注パック0.75mg	0.75mg50mL1袋	バロノセトロン塩酸塩	注	先発○	劇処		室温
アロブリール錠100mg「アメル」	100mg1錠	アロブリノール	内	後発品	処		室温
アンチレス静注10mg	1%1mL1管	エドロホニウム塩化物	注		劇処		室温
アンブロソール塩酸塩DS小兒用1.5%「タカタ」	1.5%1g	アンブロソール塩酸塩	内	後発品			室温
アンブロキソール塩酸塩シロップ小兒用0.3%「タカタ」	0.3%1mL	アンブロキソール塩酸塩	内	後発品			室温
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」	15mg1錠	アンブロキソール塩酸塩	内	後発品			室温
イオウ	10g	イオウ	外				室温
イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	リバーオキサン	内	先発品	処		室温
イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	600mg1包	イコサベント酸エチル	内	後発品			室温
イジュド点滴静注25mg	25mg1.25mL1瓶	トレメリマム(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
イジュド点滴静注300mg	300mg15mL1瓶	トレメリマム(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
イスコシン錠100mg	100mg1錠	イソニアジド	内		処		室温
イソゾール注射用0.5g	500mg1瓶(溶解液付)	チアミラーナトリウム	注		劇処		室温
イソバドシロップ70%分包30mL	70%30mL1包	イソソルビド	内	先発品	処		室温
イトラコナゾール錠50mg「日医工」	50mg1錠	イトラコナゾール	内	後発品	処		室温
イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナミビルクタクン酸エステル水和物	外	先発品	処		室温
イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g	経腸成分栄養剤	内	先発品			室温
イノパン注0.3%シリジン	0.3%50mL1筒	ドバミン塩酸塩	注	先発品	劇処		室温
イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg1カプセル	ベンラファキン塩酸塩	内	先発品	劇処		室温
イブリーフ静注20mg	20mg2mL1瓶	イブロフエン-L-リシン	注	先発品	処		室温
イベニティ皮下注105mgシリジン	105mg1.17mL1筒	ロモソズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	冷所
イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個	スマトリプタン	外	先発品	劇処		室温
イミダブリル塩酸塩錠5mg「トーア」	5mg1錠	イミダブリル塩酸塩	内	後発品	処		室温
イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶	デュルバルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
イムデラ点滴静注用10mg	10mg1瓶(輸液安定化液付)	タルラタマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
イムデラ点滴静注用1mg	1mg1瓶(輸液安定化液付)	タルラタマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
イムノプラダー膀胱用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	乾燥BCG(日本株)	外	先発品	劇処	生物	冷所
イムラン錠50mg	50mg1錠	アザチオブリソ	内		処		室温
イモバックスボリオ皮下注[冷所]	1シリンジ(0.5mL)	不活化ボリオウクチン	注		劇処	生物	凍結を避け、2~8°Cで保存
イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「トーア」	100mg5mL1瓶	イリノテカソ塩酸塩水和物	注	後発品	劇処		室温
イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「トーア」	40mg2mL1瓶	イリノテカソ塩酸塩水和物	注	後発品	劇処		室温
インクリミンロップ5%	1mL	活性ビロリノ酸第二鉄	内	後発品			室温
インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管	インジゴカルミン	注		処		室温
インスリンアスペルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	300単位1キット	インスリンアスペルト(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処		冷所
インスリングラルギンBS注ミオリオベン「リリー」	300単位1キット	インスリングラルギン(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処		冷所;冷蔵
インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	300単位1キット	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処		冷所;冷蔵
インドラシン静注用1mg	1mg1瓶	インドメタシンナトリウム水和物	注	先発品	劇処		室温
インテバクリーム1%	1%1g	インドメタシン	外	先発品			室温
インテバン外用液1%	1%1mL	インドメタシン	外	先発品			室温
インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	プロラノロール塩酸塩	注		劇処		室温
イントラリップスル20%	20%250mL1袋	ダイズ油	注		処		室温;遮光
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
インフルエンザHAワクチン(1mL/V)【小児】	1mL1瓶	インフルエンザHAワクチン	注		劇処	生物	凍結を避け、10°C以下で保存
インフルエンザHAワクチン(1mL/V)【成人】	1mL1瓶	インフルエンザHAワクチン	注		劇処	生物	凍結を避け、10°C以下で保存
インフルエンザHAワクチン(1mL/V)【入院患者】	1mL1瓶	インフルエンザHAワクチン	注		劇処	生物	凍結を避け、10°C以下で保存
ウブチド錠5mg	5mg1錠	ジスチグミン臭化物	内		毒処		室温
ウラリット配合錠	1錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	内	先発○	処		室温
ウリアック錠20mg	20mg1錠	トリロギン	内	先発品	処		室温
ウリスト製O.1mg	0.1mg1錠	イミダフェナシン	内	先発○	処		室温
ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	100mg1錠	ウルソデオキシコール酸	内	後発品			室温
ウルソ類約5%	5%1g	ウルソデオキシコール酸	内				室温
ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル	イシダカテロールマレイン酸塩・グリコビロニ	外	先発品	処		室温
ウロカルム錠225mg	225mg1錠	ウラジロガシエキス	内	先発品			室温
ウログラフィン注60%	60%20mL1管	アミドトリロソ酸ナトリウムメグルミン	注		処		室温
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	D-ソルビトール	外	先発品			室温
ウロミテキサン注400mg	400mg4mL1管	メスナ	注	先発品	処		室温
エイゾフト懸滴性点眼液1%	1%1mL	ブリソゾラミド	外	先発○	処		室温
エクザール注射用10mg	10mg1瓶	ビンプラスチン硫酸塩	注		劇処		冷所
エクストラニール腹膜透析液	1.5L1袋(排液用パッケージ付)	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
エクストラニール腹膜透析液	2L1袋	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
エクストラニール腹膜透析液	2L1袋(排液用パッケージ付)	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
エクセグラン散20%	20%1g	ゾニサミド	内	先発○	劇処		室温
エクラーブラスター20μg/cm2	(1.5mg)7.5cm × 10cm	デプロドンプロビオニン酸エステル	外	先発品			室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
エコクリン眼軟膏	1g	エリスロマイシンラクトビオニ酸塩・コリスチ	外	先発品	処		室温
エスクレ坐剤「250」	250mg1個	抱水クロラール	外	先発品	処		冷所,暗所
エスクレ坐剤「500」	500mg1個	抱水クロラール	外	先発品	処		冷所,暗所
エスキタロプラムOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	エスキタロプラムシュウ酸塩	内	後発品	劇処		室温
エスピクロン錠1mg「DSEP」	1mg1錠	エスピクロン	内	後発品	処		室温
エストリール腔鏡0.5mg	0.5mg1錠	エストリオール	外		処		室温
エスボーグ下用24000シリンジ	24,000国際単位0.5mL1筒	エボエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガフール相当量)	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	内	後発品	劇処		室温
エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガフール相当量)	テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム	内	後発品	劇処		室温
エゼチミブ錠10mg「杏林」	10mg1錠	エゼチミブ	内	後発品	処		室温
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg1カプセル	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内	後発品	処		室温
エタノール「ヨシダ」	10mL	エタノール	外				室温
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	30mg100mL1キット	エダラボン	注	後発品	処		室温
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	0.5mg1錠	エチゾラム	内	後発品	向処		室温
エトギクスコレロール1%注射液	1%30mL1瓶	ポリドカノール	注	先発品	劇処		室温
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL1瓶	エトボシド	注	後発品	劇処		室温
エナラブリルマレイイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	2.5mg1錠	エナラブリルマレイイン酸塩	内	後発品	処		室温
エナラブリルマレイイン酸塩錠5mg「EMEC」	5mg1錠	エナラブリルマレイイン酸塩	内	後発品	処		室温
エナルミンデントー筋注250mg	250mg1mL1管	テストステロノエナント酸エステル	注		処		室温
エバミール錠1.0tt	1mg1錠	ロルメタゼパム	内	先発品	向処		室温
エビプロスマット配合錠DB	1錠	オオウメガソウエキス・ハコヤナギエキス配合	内	先発品	処		室温
エビベンズ注射液0.15mg	0.15mg1筒	アドレナリン	注	先発品	劇処		室温
エビベンズ注射液0.3mg	0.3mg1筒	アドレナリン	注	先発品	劇処		室温
エビルビン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」	50mg25mL1瓶	エビルビン塩酸塩	注	後発品	劇処		冷所
エビルビン塩酸塩注射液用10mg「NK」	10mg1瓶	エビルビン塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	ラプラスグレル塩酸塩	内	先発○	処		室温
エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	ラプラスグレル塩酸塩	内	先発○	処		室温
エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	ラプラスグレル塩酸塩	内	先発○	処		室温
エブトール250mg錠	250mg1錠	エタントブール塩酸塩	内		劇処		室温
エフビード錠2.5	2.5mg1錠	セレギリソ塩酸塩	内	先発○	劇処		室温
エブランチカルカプセル15mg	15mg1カプセル	ウラビジル	内	先発品	処		室温
エブレレーン錠25mg「杏林」	25mg1錠	エブレレーン	内	後発品	処		室温
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	エペリゾン塩酸塩	内	後発品	処		室温
エペレンジ錠50mg	50mg1錠	ロキサデュスタット	内	先発品	劇処		室温
エボエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	750国際単位0.5mL1筒	エボエチン カッバ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
エホチール注10mg	1%1mL1管	エチレフリン塩酸塩	注		劇処		室温
エムラクリーム	1g	リドカイン・プロピトカイン配合剤	外	先発品	劇処		室温
エリキュース錠2.5mg	2.5mg1錠	アビキサバン	内	先発品	処		室温
エリキュース錠5mg	5mg1錠	アビキサバン	内	先発品	処		室温
エリスロンドライシロップW20%	200mg1g	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	内		処		室温
エリスロシン錠200mg	200mg1錠	エリスロマイシンステアリン酸塩	内		処		室温
エリスロコン点滴静注用500mg	500mg1瓶	エリスロマイシンラクトビオニ酸塩	注		処		室温
エリプリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	1mg2mL1瓶	エリプリンメシル酸塩	注	後発品	毒処		室温
エリルカロ清静液30mg	30.8mg2mL1管	ファスジル塩酸塩水和物	注	先発○	劇処		室温
エルカルチンFF内用液10%	10%1mL	レボカルチニン	内	先発○	処		室温
エルシートン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン	注	先発○	劇処		室温
エルネオバNF1号輸液	1,000mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	注	先発品	処		室温
エルネオバNF2号輸液	1,000mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	注	先発品	処		室温
エルネオバNF2号輸液	1,500mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	注	先発品	処		室温
エレンタール配合内用剤	10g	経腸成分栄養剤	内	先発品			室温
エンシアコ・H	10mL	経腸成分栄養剤	内	先発品			室温,密封
エンタビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ペドリマップ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
エンテカビル錠0.5mg「E」	0.5mg1錠	エンテカビル	内	後発品	劇処		室温
エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ デルクスケタカン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
エンベントクリーム1%	1%1g	クロトリマゾール	外	先発○	処		室温
エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルバルサルタントナトリウム水和物	内	先発品	処		室温
エンレスト錠200mg	200mg1錠	サクビトリルバルサルタントナトリウム水和物	内	先発品	処		室温
エンレスト錠50mg	50mg1錠	サクビトリルバルサルタントナトリウム水和物	内	先発品	処		室温
オイラクスクリーム10%	10%10g	クロタミトロン	外				室温
オーダーメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリソ水和物・クラブラン酸カリウム	内	先発品	処		室温
オーツカMV注	1瓶1管1組	高カリオーリ輸液用総ビタミン剤	注	先発品	処		室温
オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL1管	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩	注	後発品	劇処		凍結を避けて15°C以下で保存
オキサリフラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	100mg20mL1瓶	オキサリプラチナ	注	後発品	毒処		室温
オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」	200mg40mL1瓶	オキサリプラチナ	注	後発品	毒処		室温
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	50mg10mL1瓶	オキサリプラチナ	注	後発品	毒処		室温
オキサロール軟膏25 μg/g	0.0025%1g	マキサカルシトール	外	先発○	劇処		室温
オキシコソール硝酸塩錠600mg「F」	600mg1錠	オキシコソール硝酸塩	外	後発品			室温
オキシコンチントR錠20mg	20mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
オキシコンチントR錠40mg	40mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
オキシコンチントR錠5mg	5mg1錠	オキシコドン塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
オキシドール「ヤクハン」	10mL	オキシドール	外				30°C以下
オキノーム散10mg	10mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温,遮光,気密
オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドン塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
オキフィット注10mg	1%1mL1管	オキシコドン塩酸塩水和物	注	先発○	麻劇処		室温
オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」	100 μg1mL1管	オクトレオチド酢酸塩	注	後発品	劇処		冷所
オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	80mg4mL1筒	オザグレルナトリウム	注	後発品	処		室温
オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	オセルタミビルリン酸塩	内	後発品	処		室温
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	オセルタミビルリン酸塩	内	後発品	処		室温
オゼンピック皮下注2mg	2mg15mL1キット	セマグリチド(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処		冷所
オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	イリゾテカシン塩酸塩水和物	注	先発品	劇処		冷所
オノアクト点滴静注用50mg	50mg1瓶	ランジオロール塩酸塩	注	先発○	劇処		室温
オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)	アセチルコリン塩化物	注		劇処		室温
オブジーポ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
オブジーポ点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
オブジーポ点滴静注20mg	20mg2mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
オブジーポ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	ニボルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
オブソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
オブソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	モルヒネ塩酸塩水和物	内	先発品	麻劇処		室温
オフロキサン眼軟膏0.3%「ニットー」	0.3%1g	オフロキサン	外		処		室温,気密

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
オムニバク240mg10mL	51.77%10mL1瓶	イオヘキソール	注	先発品	処		室温
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カゼル2g「ニプロ」	2g1包	オメガ-3脂肪酸エチル	内	後発品			室温
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20mg1瓶	オメプラゾールナトリウム	注		処		室温
オラドールSトローチ0.5mg	0.5mg1錠	ドミフェン奥化物	外				室温
オランザビOD錠5mg「トーア」	5mg1錠	オランザビン	内	後発品	劇処		室温
オリブ油(丸石)	10mL	オリブ油	外				室温
オルケティア錠1mg	1mg1錠	エボカルセト	内	先発品	劇処		室温
オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	モノエタノールアミンオレイン酸塩	注	先発品	劇処		室温
オルベス100μgインヘルー56吸入用	5.6mg3.3g1キット	シクロソニド	外	先発品	処		室温
オルミエント錠4mg	4mg1錠	バリシチニブ	内	先発品	劇処		室温
オルメタルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	オルメタルタンメドキソミル	内	後発品	処		室温
オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	アバセプト(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーア」	5mg1錠	オロバタジン塩酸塩	内	後発品			室温
オンコピン注射用1mg	1mg1瓶	ビンクリスチン硫酸塩	注	先発品	劇処		冷所
オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	オビカボン	内	先発品	劇処		室温
オンドサンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg2mL1筒	オンドサンセトロン塩酸塩水和物	注	後発品	劇処		室温
オンテキサ静注用200mg	200mg1瓶	アンテキサネット(アルファ(遺伝子組換え))	注	先発品	処	生物	冷所
オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル	インダカタロールマレイン酸塩	外				室温
カーボスター透析剤・L	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	人工透析液	注	先発品	処		室温
ガスコンドップ内用液2%	2%1mL	ジメチコン	内	準先発			室温
ガスコン錠40mg	40mg1錠	ジメチコン	内				室温
ガスチーム散4万単位/g	20,000単位	プロナーゼ	内	先発品	処		室温
カタリン点眼用0.005%	0.005%1mL(溶解後の液として)	ビレノキシン	外				室温
カチリ「ヨシダ」	10g	フェノール・亜鉛華リニメント	外				室温
カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	ヨウ素	外	先発品			直射日光、高温を避け、室温で保存
カデックス軟膏分包45mg	0.9%1g	ヨウ素	外	先発品			室温
カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツズマブ エムタシン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	トラスツズマブ エムタシン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg1カプセル	カナマイシン-硫酸塩	内		処		室温
カバペン錠200mg	200mg1錠	カバペンチン	内	先発品	処		室温
カブトリル錠25mg	25mg1錠	カブトリル	内	先発品	処		室温
ガベキサートメシリ酸塩注射用100mg「サワイ」	100mg1瓶	ガベキサートメシリ酸塩	注	★	劇処		室温
ガベキサートメシリ酸塩注射用500mg「サワイ」	500mg1瓶	ガベキサートメシリ酸塩	注	後発品	劇処		室温
カベシタビン錠300mg「日医工」	300mg1錠	カベシタビン	内	後発品	劇処		室温
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	1mg1錠	カベルゴリン	内	★	劇処		室温
カモスタットメシリ酸塩錠100mg「日医工」	100mg1錠	カモスタットメシリ酸塩	内	後発品	処		室温
カリメート経口液20%	20%25g1包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	内				室温
カルシリオール静注液0.5μg「FJ」	0.5μg1mL1管	カルシリオール	注	後発品	劇処		室温
カルセド注射用20mg	20mg1瓶	アムルビシン塩酸塩	注	先発品	劇処		室温
カルゼド注射用50mg	50mg1瓶	アムルビシン塩酸塩	注	先発品	劇処		室温
カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	グルコン酸カルシウム水和物	注		処		室温
カルナクリン錠50	50単位1錠	カリジノゲナーゼ	内	準先発			室温
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	注	後発品	処		室温
カルベジオール錠10mg「トーア」	10mg1錠	カルベジロール	内	後発品	処		室温
カルベジロール錠2.5mg「トーア」	2.5mg1錠	カルベジロール	内	後発品	処		室温
カルボカインブル注2%	2%10mL1管	メビパカイン塩酸塩	注		劇処		室温
カルボシステインDS50%「トーア」	50%1g	L-カルボシステイン	内	後発品			室温
カルボシステインシロップ小兒用5%「トーア」	5%1mL	L-カルボシステイン	内	後発品			室温
カルボシステイン錠250mg「トーア」	250mg1錠	L-カルボシステイン	内	★			室温
カルボプラチン注射液150mg「日医工」	150mg15mL1瓶	カルボプラチン	注	★	毒処		室温
カルボプラチン注射液450mg「日医工」	450mg45mL1瓶	カルボプラチン	注		後発品	毒処	室温
カルボプラチン注射液50mg「日医工」	50mg5mL1瓶	カルボプラチン	注	★	毒処		室温
カロナール細粒20%	20%1g	アセトアミノフェン	内		劇		室温
ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶	ガンシクロビル	注	後発品	毒処		室温
カンデサルタント錠4mg「トーア」	4mg1錠	カンデサルタントセキセル	内	後発品	処		室温
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	100mg1瓶	カンレノ酸カリウム	注	後発品	劇処		室温
キイトルーグ点滴静注液100mg	100mg4mL1瓶	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
キシロカインゼリー2%	2%1mL	リドカイン塩酸塩	外				室温
キシロカインピスカス2%	2%1mL	リドカイン塩酸塩	内		劇		室温
キシロカインボンブスプレー8%	1g	リドカイン	外	後発品	劇		室温
キシロカイン液「4%」	4%1mL	リドカイン塩酸塩	外				室温
キシロカイン注シリソング1%	1%10mL1筒	リドカイン塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
キシロカイン泡ボリアンプ1%	1%10mL1管	リドカイン塩酸塩	注		劇処		室温
キシロカイン泡ボリアンプ2%	2%10mL1管	リドカイン塩酸塩	注		劇処		室温
キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100,000)含有	0.5%10mLバイアル	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	注		劇処		冷所
キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100,000)含有	1%10mLバイアル	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	注		劇処		冷所
キシロカイン点眼液4%	4%1mL	リドカイン塩酸塩	外				冷所
ギヤデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚	カルムスチン	外	先発品	劇処		冷凍・遮光
キンダリーオ透析剤AF5号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	人工透析液	注	先発品	処		室温
クアゼバム錠15mg「サワイ」	15mg1錠	クアゼバム	内	後発品	向処		室温
クインバックス水性懸濁注射用[冷所]	0.5mL1キット	沈降精製日本きわみジテリア破傷風不活化ボリ	注		劇処	生物	2~8°Cで保存
クエチアビン錠50%「トーア」	50%1g	クエチアビンフル酸塩	内	後発品	劇処		室温
クエチアビン錠100mg「トーア」	100mg1錠	クエチアビンフル酸塩	内	後発品	劇処		室温
クエチアビン錠12.5mg「アメル」	12.5mg1錠	クエチアビンフル酸塩	内	後発品	劇処		室温
クエチアビン錠25mg「トーア」	25mg1錠	クエチアビンフル酸塩	内	後発品	劇処		室温
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	50mg1錠	クエン酸第一鉄ナトリウム	内	★			室温
グラシアフル配合点眼液	1mL	リバシジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸	外	先発品	処		室温
クラシエカルバムエキス細粒	1g	樂朴湯エキス	内				室温
クラシエ樂帝湯エキス細粒	1g	樂帝湯エキス	内				室温
クラシエ当帰芍藥散エキス細粒	1g	當帰芍藥散エキス	内				室温
クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	1g	八味地黄丸エキス	内		劇		室温
クラシエ補中益氣湯エキス細粒	1g	補中益氣湯エキス	内				室温
グラニセトロン静注液3mgシリソング「サワイ」	3mg3mL1筒	グラニセトロン塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	3mg50mL1袋	グラニセトロン塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミファ」	1mg1包	グラニセトロン塩酸塩	内	後発品	劇処		室温
クラバモックス小兒用配合ドライシロップ	(636.5mg)1g	アモキシシリソ水和物・クラブラン酸カリウム	内	先発品	処		室温
クラフォラン注射用1g	1g1瓶	セフオタキシムナトリウム	注	先発品	処		室温
クラリストロマイシンDS10%小兒用「サワイ」	100mg1g	クラリストロマイシン	内		処		室温
クラリストロマイシン錠200mg「CH」	200mg1錠	クラリストロマイシン	内		処		室温
クリアクター静注用40万	40万国際単位1瓶	モンテブライゼ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
グリセリンBC液「シダ」	10mL	グリセリン	外				室温
グリセリン洗腸「オフタ」120	50%120mL1個	グリセリン	外				室温
グリセリン洗腸「オフタ」60	50%60mL1個	グリセリン	外				室温
グリセリン洗腸「オフタ」小兒用30	50%30mL1個	グリセリン	外				室温
グリメサゾ軟膏	1g	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	外				室温
グリメビリドOD錠1mg「ケミファ」	1mg1錠	グリメビリド	内	★	劇		室温
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル	注	処			室温
グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶(溶解液付)	グルカゴン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇		冷所
グルコサンK細粒4mEq/g	カリウム4mEq1g	グルコサン酸カリウム	内	先発品			室温
グルトバ注2400万	2,400万国際単位1瓶(溶解液付)	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	室温
グルトバ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	室温
クレキサン皮下注キット2000IU	2,000低分子ヘパリン国際単位0.	エノキサバリンナトリウム	注	先発品	劇	生物	室温
クレセシソ点滴静注用200mg	200mg1瓶	イサブコナゾーム硫酸塩	注	先発品	劇		冷所
クロチアゼバ綴5mg「トーワ」	5mg1錠	クロチアゼバム	内	後発品	向		室温
クロビドグレル綴25mg「ケミファ」	25mg1錠	クロビドグレル硫酸塩	内	後発品	処		室温
クロビドグレル綴75mg「SANIK」	75mg1錠	クロビドグレル硫酸塩	内	後発品	処		室温
クロベタノールプロピオニン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	クロベタノールプロピオニン酸エステル	外	後発品	劇		室温
クロマイ-P軟膏	1g	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合	外	准先発			室温
クロモグリク酸Na・PF点眼液2%「日点」	100mg5mL1瓶	クロモグリク酸ナトリウム	外	後発品			室温
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	1%2mL1管	クロモグリク酸ナトリウム	★				室温
クロラムフェニコール錠100mg「F」	100mg1錠	クロラムフェニコール	外				室温
ケイセントラ静注用1000	1,000国際単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	注	先発品	処	特生	凍結を避けて25°C以下で保存
ケイセントラ静注用500	500国際単位1瓶(溶解液付)	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	注	先発品	処	特生	凍結を避けて25°C以下で保存
ケイツーN静注10mg	10mg1管	メナトレノン	注	先発品	処		室温
ケイツーシロップ0.2%	0.2%1mL	メナトレノン	内	先発品			室温
ゲーベンリーム1%	1%1g	スルファジアン銀	外	先発品			室温
ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶	ドナマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶	ケタミン塩酸塩	注	先発品	麻劇処		室温
ケトプロフェンテーブ20mg「三和」	7cm×10cm1枚	ケトプロフェン	外	後発品			室温,遮光,気密
ケナコルト-A筋注入用関節腔内用氷水注入40mg/1mL	40mg1瓶	トリアムシノロシアトニド	注	処			室温
ケナコルト-A皮内用関節腔内用氷水注入50mg/5mL	10mg1mLバイアル	トリアムシノロシアトニド	注	処			室温
ゲムシタビン点滴静注液1/25mL「NK」	1g25mL1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	注	後発品	劇		冷所
ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」	200mg5mL1瓶	ゲムシタビン塩酸塩	注	後発品	劇		冷所
ゲンタシソ軟膏0.1%	1mg1g	ゲンタマイシン硫酸塩	外	先発品			室温
ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	40mg1管	ゲンタマイシン硫酸塩	注	先発品	劇		室温
コアテック5mg	5mg5mL1管	オルブリノン塩酸塩水和物	注	先発品	処		室温
コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶	ランジオロール塩酸塩	注	先発品	劇		室温
コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒドロカルチゾン	内	処			室温
コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)	デトラコサチド酢酸塩	注	先発品	処		冷所
コスパンカプセル40mg	40mg1カプセル	プロプロピオン	内	先発品			室温
コスマゲン静注用0.5mg	0.5mg1瓶	アクチノマイシンD	注	先発品	劇		冷所
コディインリン酸塩散1%「ホエイ」	1%1g	コディインリン酸塩水和物	内	劇			室温
ゴナックス皮下注入120mg	120mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩	注	先発品	劇		室温
ゴナックス皮下注入240mg	240mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩	注	先発品	劇		室温
ゴナックス皮下注入80mg	80mg1瓶(溶解液付)	デガレリクス酢酸塩	注	先発品	劇		室温
コラント綴2.5mg	2.5mg1錠	イバブライジン塩酸塩	内	先発品	劇		室温
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	コルヒチン	内	劇			室温
コントミニ糖衣綴12.5mg	12.5mg1錠	クロルプロマジン塩酸塩	内	処			室温
コントミニ糖衣綴25mg	25mg1錠	クロルプロマジン塩酸塩	内	処			室温
ザーネ軟膏0.5%	5,000単位1g	ビタミンA油	外	先発品			室温
サーファクタん気管注入用120mg	120mg1瓶	肺サーファクタント	外	先発品	処	生物	冷所
サイプレジン1%点眼液	1%1ml	シクロベントラート塩酸塩	外	先発品			室温
サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
サイレース静注2mg	2mg1管	フルニトラゼバム	注	先発品	向		室温
サビーン点滴静注用500mg	500mg1瓶	デクスラゾキサン	注	先発品	劇		室温
サフネロー点滴静注300mg	300mg2mL1瓶	アニフロラム(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
サブパック血液ろ過用補充液-Bi	2,020mL1キット	人工透析液	注	後発品	処		室温
サムタニ点滴静注用8mg	8mg1瓶	トルバタシリン酸エヌトリウム	注	先発品	劇		室温
サラズルファビリジン腸溶錠500mg「CHJ」	500mg1錠	サラズルファビリジン	内	後発品	処		室温
サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル	セビメリン塩酸塩水和物	内	先発品			室温
ザルコニン液0.05	0.05%10mL	ベンザルコニウム塩化物	外				室温
ザルコニン液0.1	0.1%10mL	ベンザルコニウム塩化物	外				室温
ザルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL1瓶	サルタマモール硫酸塩	外	先発品	処		室温
ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	アフリペリセプトヘータ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	アフリペルセプトヘータ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
サルボグラーー塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	サルボグレート塩酸塩	内	後発品			室温
サンドールP点眼液	1mL	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩	外	後発品			室温
サンビ点眼液2%	2%5mL1瓶	ビロカルビン塩酸塩	外	劇			室温
サンリズム注射液50	50mg5mL1管	ビルシカイド塩酸塩水和物	注	先発品	劇		室温
ジアグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	インドシアニグリーン	注	先発品	処		室温
シアノコバラミン注1000μg「NP」	1mg1管	シアノコバラミン	注	先発品	処		室温
シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」	0.02%5mL1瓶	シアノコバラミン	外	後発品			室温
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボード	3.6mg0.36mL1キット	ベグフィルグラスマチム(遺伝子組換え)	注	先発品	処		冷所,冷蔵
ジェブナ点滴静注60mg	60mg1.5mL1瓶(溶解液付)	カバジタキセウ アンチ付加物	注	先発品	毒		15-30°Cで保存
シェルガンの5眼粘滑剤	0.5mL1筒	種類ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン	外	後発品			室温
ジオクチルソジウムスルホサクシネット耳用液5%「CEO」	5%1ml	ジオクチルソジウムスルホサクシネット	外	後発品			室温
シオソール注25mg	25mg1mL1管	全チオリンガ酸ナトリウム	注	先発品	劇		室温
ジオン注無痛化剤	10mL1瓶(希釈液付)	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	注	先発品	劇		室温
ジクトルナーフ75mg	75mg1枚	ジクロロフェナクナトリウム	外	先発品	処		室温
ジクロフェナクナ坐剤25mg「日新」	25mg1個	ジクロフェナクナトリウム	外	後発品	劇		冷所
ジクロフェナクナ坐剤50mg「日新」	50mg1個	ジクロフェナクナトリウム	外	後発品	劇		冷所
ジクロフェナクナ錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ジクロフェナクナトリウム	内	後発品	劇		室温
ジゴシン注0.25mg	0.025%1mL1管	ジゴキシン	注		劇		室温
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶	シスプラチン	注	★	毒		室温
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	25mg50mL1瓶	シスプラチン	注	★	毒		室温
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶	シスプラチン	注	★	毒		室温
ジスロマック錠250mg	250mg1錠	アジスロマイシン水和物	内	先発○	処		室温
ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	アジスロマイシン水和物	注	先発品	処		室温
シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2,000JAU1錠	スギ花粉エキス	内	先発品	処		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5,000JAU1錠	スギ花粉エキス	内	先発品	処		室温
シナール配合顆粒	1g	アスコルビン酸・パンテン酸カルシウム	内				室温
シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶	バリビズマグ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	冷所
シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶	バリビズマグ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	冷所
ジノプロスト注射液1000μg「F」	1mg1mL1管	ジノプロスト	注	後発品	劇処		室温
ジフェニドール塩酸塗25mg「NIG」	25mg1錠	ジフェニドール塩酸塩	内	後発品			室温
ジブレオサザイディス錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン	内	先発○	劇処		室温
シプロキサン錠200mg	200mg1錠	シプロフロキサン塩酸塩	内	先発品	処		室温
シプロフロキサン点滴静注液400mg「ニプロ」	400mg200mL1袋	シプロフロキサン	注	後発品	処		室温
シムピコートターピュヘイラー60吸入	60吸込1キット	ブデシニド・ホルモロールフルマル酸塩水和物	外	先発○	処		室温
ジャディアヌ錠10mg	10mg1錠	エンバグリフロジン	内	先発品	処		室温
ジャヌピア錠50mg	50mg1錠	シタグリブチニン酸塩水和物	内	先発品	処		室温
ジルチアゼム塩酸塗徐放カプセル100mg「日医工」	100mg1カプセル	ジルチアゼム塩酸塩	内	後発品	処		室温
ジルチアゼム塩酸塗注射用10mg「サワイ」	10mg1瓶	ジルチアゼム塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
シロスタゾールOD錠100mg「トーア」	100mg1錠	シロスタゾール	内	後発品			室温
シロスタゾールOD錠50mg「トーア」	50mg1錠	シロスタゾール	内	後発品			室温
シロドシンOD錠2mg「DSEP」	2mg1錠	シロドシン	内	後発品	劇処		室温
シングリックス筋注液(冷所)	一人分1瓶(溶解液付)	被膜組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムス)	注		劇処	生物	凍結を避けて、2~8°Cで保存
シンピット静注用50mg	50mg1瓶	ニフェカラント塩酸塩	注	先発品	劇処		室温
シンボニー皮下注50mgシリソジ	50mg0.5mL1筒	ゴリムマグ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	ナルメジントン酸塩	内	先発品	処		室温
スーグラ錠50mg	50mg1錠	イブラグラフロジン・プロリン	内	先発品	処		室温
スガマデクス静注液200mgシリソジ「F」	200mg2mL1筒	スガマデクスナトリウム	注	後発品	処		室温
スキサトニウム注40「マルイシ」	2%2mL1管	スキサメトニウム塩化物水和物	注		毒処		冷所
スキリージ点滴静注600mg	600mg10mL1瓶	リサンキズマグ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
スキリージ皮下注360mgオートドーザー	360mg2.4mL1キット	リサンキズマグ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
スクロードバスタ	1g	精製白糖・ボビドンヨード	外	後発品			室温
ステラーラ点滴静注130mg	130mg26mL1瓶	ウステキヌマグ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ステラーラ皮下注45mgシリソジ	45mg0.5mL1筒	ウステキヌマグ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇処	生物	冷所
ステリクリン液0.5	0.5%10mL	クロルヘキシジングルコン酸塩	外				室温
ストレブトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g1瓶	ストレブトマイシン硫酸塩	注		処		室温
ストロカイン錠5mg	5mg1錠	オキセザザイン	内				室温
ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	イベルメクチン	内	先発品	劇処		室温
スピーブ膏M	25cm21枚	サリチル酸鉄剤膏	外				透光
スピオルトレスピマット28吸入	28吸込1キット	オトロビウム奥化物水和物・オロダテロール	外	先発品	処		室温
スピリード [®] 2.5μgレスピマット60吸入	150μg1キット	オトロビウム奥化物水和物	外	先発品	処		室温
スピロノラクトン錠25mg「トーア」	25mg1錠	スピロノラクトン	内	後発品	処		室温
スマトリアン錠50mg「TWJ」	50mg1錠	スマトリップタノハク酸塩	内	後発品	劇処		室温
スルバシン静注用0.75g	(0.75g)1瓶	アンビシリントナトリウム・スルバクタムナトリウム	注		処		室温
スルバリン静注用3g	(3g)1瓶	アンビシリントナトリウム・スルバクタムナトリウム	注		処		室温
スルビリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	スルビリド	内				室温
セパン [®] 錠1	1mg1錠	クロキサゾラム	内	先発品	向処		室温
セパミット-R細粒2%	2%1g	ニフェジビン	内	先発品	劇処		室温,透光,気密
セファクル細粒20%「日医工」	200mg1g	セファクロル	内		処		室温
セファゾリンNa注射用1g「CHM」	1g1瓶	セファゾリンナトリウム	注		処		室温
セファキシン錠250mg「日医工」	250mg1錠	セファレキシン	内		処		室温
セフェビム塩酸塗静注用1g「サンド」	1g1瓶	セフェビム塩酸塩水和物	注	後発品	処		室温
セフジトランビオキシル小児用細粒10%「SW」	100mg1g	セフジトランビオキシル	内		処		室温
セフタジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	セフタジム水和物	注		処		室温
セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフトリアキソナトリウム水和物	注		処		室温
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム	注		処		室温
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL	セボフルラン	外	後発品	劇処		室温
セルシ [®] 散1%	1%1g	ジアゼバム	内		向処		室温
セルトラリン錠25mg「明治」	25mg1錠	セルトラリン塩酸塩	内	後発品	劇処		室温
ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm1枚	ゼラチン	外				室温
セレコキシブ錠100mg「JG」	100mg1錠	セレコキシブ	内	後発品	劇処		室温
セレコキシブ錠200mg「DSEP」	200mg1錠	セレコキシブ	内	後発品	劇処		室温
セレスタン配合錠	1錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン	内	準先発	処		室温
セレニカ [®] 顆粒40%	40%1g	バルブロ酸ナトリウム	内	先発○	処		室温
セレネース注5mg	0.5%1mL1管	ハロベリドール	注		劇処		室温
センノード錠12mg「NIG」	12mg1錠	センノソド	内	後発品			室温
ゾコバ錠125mg	125mg1錠	エンシトレルビル フマル酸	内	先発品	劇処		室温
ソセゴン [®] 注射液15mg	15mg1管	ベンタゾン	注	先発品	劇処		室温
ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	ペルフルブタン	注	先発品	処		室温
ソニサド [®] 錠100mg「アメル」	100mg1錠	ソニサミド	内	後発品	劇処		室温
ゾビクロン錠7.5mg「トーア」	7.5mg1錠	ゾビクロン	内	後発品	向処		室温
ソフラチュール貼付剤10cm (10.8mg)10cm×10cm1枚		フライオマイン硫酸塩	外				室温
ゾラデックス3.6mgデボ	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	ゴセレリン酢酸塩	注	先発品	劇処		冷所
ゾラデックスLA10.8mgデボ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	ゴセレリン酢酸塩	注	先発品	劇処		冷所
ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミド塩酸塩	内	先発品			室温
ソリタ-T2号輸液	500mL1袋	脱水補給液	注		処		室温
ソリタ-T4号輸液	500mL1袋	術後回復液	注		処		室温
ソリフナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーア」	2.5mg1錠	コハク酸ソリフナシン	内	後発品	処		室温
ソル・コーテ [®] 注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	注		処		室温
ソル・メドロール静注用1000mg	1g1瓶(溶解液付)	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注	先発品	処		室温
ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注	先発品	処		室温
ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注	先発品	処		室温
ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	メチルブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	注	先発品	処		室温
ソルアセトF輸液	500mL1袋	酢酸リソゲン液	注		処		室温
ソルデ [®] 1輸液	500mL1袋	開始液	注		処		室温
ソルデム1輸液	200mL1袋	開始液	注		処		室温
ソルデム3AG輸液	500mL1袋	維持液	注		処		室温
ソルデム3A輸液	500mL1袋	維持液	注		処		室温
ソルデム3A輸液	200mL1袋	維持液	注		処		室温
ゾルトフアイ配合注 フレックスタッチ	1キット	インスリン・デグルデク(遺伝子組換え)・リラグ	注	先発品	劇処		冷所
ゾルビデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ゾルビデム酒石酸塩	内	後発品	向処		室温
ゾルミトリブンOD錠2.5mg「VTRS」	2.5mg1錠	ゾルミトリブン	内	後発品	劇処		室温
ゾレア皮下注150mgシリソジ	150mg1mL1筒	オマリズマグ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所,冷蔵
ゾレドロン酸点滴注4mg/100mLバッグ「トーア」	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸水和物	注	後発品	劇処		室温
ダーブロック錠1mg	1mg1錠	ダブロデュstatt	内	先発品	劇処		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
ダーブロック錠4mg	4mg1錠	ダブロデュstatt	内	先発品	劇処		室温
ダイアップ坐剤4	4mg1個	ジアゼバム	外	先発品	向処		室温
ダイアップ坐剤6	6mg1個	ジアゼバム	外	先発品	向処		室温
ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタゾラミド	内		処		室温
ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	アセタゾラミドナトリウム	注		処		室温
ダイエフェン配合錠	1錠	スルファメトキサゾール・トリメトブリム	内		処		室温
ダイエフェン配合顆粒	1g	スルファメトキサゾール・トリメトブリム	内		処		室温
ダカルバジン注射用100	100mg1瓶	ダカルバジン	注	先発品	劇処		冷所
タグリッソ錠80mg	80mg1錠	オシメルチニメシル酸塩	内	先発品	劇処		室温
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	0.5mg1カプセル	タクロリムス水和物	内	後発品	劇処		室温
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	1mg1カプセル	タクロリムス水和物	内	後発品	劇処		室温
タケキャップOD錠10mg	10mg1錠	ボノブランツマフル酸塩	内	先発品	処		室温
タケキャップOD錠20mg	20mg1錠	ボノブランツマフル酸塩	内	先発品	処		室温
タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm1枚	フィブリノゲン配合剤	外	先発品	処	特生	室温
タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm1枚	フィブリノゲン配合剤	外	先発品	処	特生	室温
タゾビペ配合静注用2.25「明治」	(2.25g)1瓶	タゾバクタム・ビペラシリン水和物	注	後発品	処		室温
タゾビペ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	タゾバクタム・ビペラシリン水和物	注	後発品	処		室温
ダトロウェイ点滴静注用100mg	100mg1瓶	ダトボタマブデルクステカーン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg1瓶	ダブトマイシン	注	後発品	処		室温
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーア」	0.2mg1錠	タムスロシン塩酸塩	内	後発品	処		室温
タモキシフェン錠20mg「MYL」	20mg1錠	タモキシフェンエン酸塩	内	後発品	処		室温,遮光
ダランシカプセル150mg	150mg1カプセル	クリンダマイシン塩酸塩	内	先発品	処		室温
タリージュOD錠10mg	10mg1錠	ミロガバリンベンズル酸塩	内	先発品	処		室温
タリージュOD錠5mg	5mg1錠	ミロガバリンベンズル酸塩	内	先発品	処		室温
タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	オフロキサシン	外	先発品	処		室温
タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニブ塩酸塩	内	先発○	劇処		室温
タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニブ塩酸塩	内	先発○	劇処		室温
タルチーリンOD錠5mg「サワイ」	5mg1錠	タルチーリン水和物	内	後発品	処		室温
タルテバリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	5,000低分子ヘパリン国際単位1瓶	タルテバリンナトリウム	注	★	処	生物	室温
ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
ダルベボエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	180μg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
ダルベボエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	20μg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL1筒	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
タンンドスリコンクエン酸塩錠10mg「トーア」	10mg1錠	タンンドスピロクエン酸塩	内	後発品	劇処		室温
ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	ダントロレンナトリウム水和物	内	先発品	処		室温
ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	ダントロレンナトリウム水和物	注	先発品	処		室温
タシニン酸アルブミン「ケンエー」	1g	タシニン酸アルブミン	内				室温
チアブド錠25mg「サワイ」	25mg1錠	チアブド塩酸塩	内	後発品	処		室温
チエナム点滴静注用0.5g	500mg1瓶	イミベネム水和物・シラスタチナトリウム	注	先発○	処		室温
チザニジン錠1mg「日医工」	1mg1錠	チザニジン塩酸塩	内	後発品	処		室温
チモロールPF点眼液0.5%「日点」	0.5%1mL	チモロールマレイン酸塩	外	後発品			室温
チラードS錠50μg	50μg1錠	レボチロキサンナトリウム水和物	内		劇処		室温
ツムラ加味逍散エキス顆粒(医療用)	1g	加味逍散エキス	内				室温
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	葛根湯エキス	内				室温
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	牛車腎気丸エキス	内				室温
ツムラ五帝散エキス顆粒(医療用)	1g	五帝散エキス	内				室温
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	1g	小青竜湯エキス	内				室温
ツムラ人参養容湯エキス顆粒(医療用)	1g	人參養容湯エキス	内				室温
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	大黄甘草湯エキス	内				室温
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	大建中湯エキス	内				室温
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	麦門冬湯エキス	内				室温
ツムラ半夏消心湯エキス顆粒(医療用)	1g	半夏消心湯エキス	内				室温
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	防風通聖散エキス	内				室温
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	抑肝散エキス	内				室温
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	六君子湯エキス	内				室温
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	芍薬甘草湯エキス	内				室温
ツロブテロールテープ5mg「サワイ」	0.5mg1枚	ツロブテロール	外	★	処		室温
ツロブテロールテープ1mg「サワイ」	1mg1枚	ツロブテロール	外	後発品	処		室温
ツロブテロールテープ2mg「サワイ」	2mg1枚	ツロブテロール	外	後発品	処		室温
ディスコピクタ1.0眼粘弾剤	1mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン	外	先発品			冷所
デエビゴ錠2.5mg	2.5mg1錠	レンボレキサン	内	先発品	処		室温
デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンボレキサン	内	先発品	処		室温
テオフィリン徐放U錠100mg「トーア」	100mg1錠	テオフィリン	内	後発品	処		室温
テオロング錠50mg	50mg1錠	テオフィリン	内	★	処		室温
デカドリン錠0.5mg	0.5mg1錠	デキサメタゾン	内		処		室温
デカドロン錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン	内		処		室温
デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	後発品	処		室温
デキサート注射液3.3mg	3.3mg1mL1管	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	後発品	処		室温
デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	注	後発品	処		室温
デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.01%1mL	デキサメタゾン	内	後発品	処		室温
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NPK」	0.1%1g	デキサメタゾン	外	後発品			室温
デクスマメドミジン静注液200μg「サンド」	200μg2mL1瓶	デクスマメドミジン塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
テグレートル細粒50%	50%1g	カルバマゼピン	内		処		室温
テグレートル錠200mg	200mg1錠	カルバマゼピン	内		処		室温
デシコビ配合錠HT	1錠	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド	内	先発品	劇処		室温
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	125μg1瓶	デスモプレシン酢酸塩水和物	外	先発品	劇処		冷所
テゼスピア皮下注210mgシリンジ	210mg1.91mL1筒	テゼベルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
テセントリック点滴静注1200mg	1,200mg20mL1瓶	テゾソリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
テセントリック点滴静注840mg	840mg14mL1瓶	テゾソリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
テナノブレインH静注250単位	250国際単位1瓶	ボリエチレンギリコール処理抗破傷風人免疫グロブulin	注	先発品	劇処	生物	冷所
テッペーザ点滴静注用500mg	500mg1瓶	テプロツムマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
デトキソール静注液2g	10%20mL1瓶	チオ硫酸ナトリウム水和物	注		処		室温
テトラミド錠10mg	10mg1錠	ミアンセリシン塩酸塩	内	先発品	処		室温
テネリアOD錠20mg	20mg1錠	テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物	内	先発品			室温
デノタヌチアブル配合錠	1錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・ジ	内	先発品			室温
テブレーン細粒10%「トーア」	10%1g	テブレノン	内	★			室温
テモゾロミド錠100mg「NPK」	100mg1錠	テモゾロミド	内	後発品	毒処		室温
テモゾロミド錠20mg「NPK」	20mg1錠	テモゾロミド	内	後発品	毒処		室温
テモダール点滴静注用100mg	100mg1瓶	テモゾロミド	注	先発品	毒処		冷所
デュビクセント皮下注300mgペニ	300mg2mL1キット	デュビルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
デュロキセチンOD錠20mg「明治」	20mg1錠	デュロキセチン塩酸塩	内	後発品	劇		室温
テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg1瓶(溶解液付)	テリバラチド酢酸塩	注	先発○	処		室温
テリルジー100エリクタ14吸入用	14吸1入キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメ	外	先発品	処		室温
テルミサルタン錠20mg「DSEP」	20mg1錠	テルミサルタン	内	後発品	処		室温
デルモベートスカルプローション0.05%	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外	先発○	劇		室温
テルモ生食	500ml1袋	生理食塩液	注	先発品	処		室温
トアラセト配合錠「トーア」	1錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合	内	後発品	劇		室温
トウモロコシデンプン「ヨシダ」	10g	トウモロコシデンプン	内				室温
トーワチーム配合顆粒	1g	非ビリン系感冒剤	内	後発品	劇		室温
ドキサゾシン錠1mg「YD」	1mg1錠	ドキサゾシンメチル酸塩	内	後発品	処		室温
ドキシナ注20mg	20mg10mL1瓶	ドキソルビン塩酸塩	注	先発品	劇		冷所
ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	ドキソルビン塩酸塩	注	後発品	劇		室温
トコフェオール酢酸エステル錠50mg「トーア」	50mg1錠	トコフェオール酢酸エステル	内	後発品			室温
トスフロキサントン塩酸塩細粒小兒用15%「トーア」	150mg1g	トスフロキサントン塩酸塩水和物	内	後発品	処		室温
ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニブロ」	20mg1mL1瓶	ドセタキセル	注	後発品	毒		室温
ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニブロ」	80mg4mL1瓶	ドセタキセル	注	後発品	毒		室温
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーア」	3mg1錠	ドネペジル塩酸塩	内	後発品	劇		室温
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーア」	5mg1錠	ドネペジル塩酸塩	内	後発品	劇		室温
ドバコール配合錠L100	1錠	レボドバ・カルビドバ水和物	内	後発品	処		室温
ドバストン静注50mg	0.25%20mL1管	レボドバ	注	先発品	処		室温
ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「VTRS」	100mg5mL1管	ドバミン塩酸塩	注	後発品	劇		室温,密封
ドバミン塩酸塩点滴静注200mgキット「VTRS」	0.1%200mL1袋	ドバミン塩酸塩	注	後発品	劇		室温
トビラマート錠50mg「アメル」	50mg1錠	トビラマート	内	後発品	処		室温
トブレクリーム0.05%	0.05%1g	フルオシノニド	外	先発○	劇		室温
トブシム軟膏0.05%	0.05%1g	フルオシノニド	外	先発○	劇		室温
ドブスマOD錠100mg	100mg1錠	ドキシドバ	内	先発品	処		室温
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒	ドブタミン塩酸塩	注	後発品	劇		室温
ドブタミン持続静注50mgシリンジ「テルモ」	0.1%50mL1筒	ドブタミン塩酸塩	注	後発品	劇		室温
ドブラム注射液400mg	20mg1mLバイアル	トキサプラム塩酸塩水和物	注	先発品	劇		室温
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NKJ」	150mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	処	生物	冷所
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NKJ」	60mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	処	生物	冷所
トラセミドOD錠4mg「TE」	4mg1錠	トラセミド	内	後発品	処		室温
トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナグリブチン	内	先発品	処		室温
トラゾン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	トラゾドン塩酸塩	内	後発品	劇		室温
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	50mg1錠	トラゾドン塩酸塩	内	後発品	劇		室温
トラネキサム酸カプセル250mg「トーア」	250mg1カプセル	トラネキサム酸	内	後発品			室温
トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	10%10mL1管	トラネキサム酸	注	後発品	処		室温
トラベルシム配合錠	1錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィ	内				室温
トラマール注100	100mg1管	トラマドール塩酸塩	注	先発品	劇		室温
トラマリント点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL	トラマゾリン塩酸塩	外		劇		室温
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg1錠	トラマドール塩酸塩	内	後発品	劇		室温
トランサン注10%	10%2.5mL1管	トラネキサム酸	注	先発品	処		室温
トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠	トリアゾラム	内	後発品	向		室温
トリクロールシリップ10%	10%1mL	トリクロホスナトリウム	内		劇		冷所
トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	2mg1錠	トリクロルメチアジド	内	後発品	処		室温
トリブタール錠10	10mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩	内	後発品	処		室温
トリブタール錠25	25mg1錠	アミトリプチリン塩酸塩	内	後発品	処		室温
トリメブチナマレイン酸塩錠100mg「トーア」	100mg1錠	トリメブチナマレイン酸塩	内	後発品			室温
トルバタシンOD錠7.5mg「ニブロ」	7.5mg1錠	トルバタシン	内	後発品	劇		室温
トルバタシン顆粒1%「トーア」	1%1g	トルバタシン	内	後発品	劇		室温
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット	デュラグルチド(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
トレーランG液75g	225mL1瓶	デシン部分加水分解物	内	先発品	処		室温
トレシーパ注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリン デグリザクル(遺伝子組換え)	注	先発品	劇		冷所
トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶	サツシマズマゴビテカン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
ドロレブシン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル	ドロベリドール	注	先発品	劇		室温
トロンビン液モチダソフトボトル1万	10,000単位10mL1キット	トロンビン	外		処		凍結を避けて10°C以下で保存
ドンペリドン坐剤10mg「JG」	10mg1個	ドンペリドン	外	後発品			室温
ドンペリドン坐剤30mg「JG」	30mg1個	ドンペリドン	外	後発品			室温
ドンペリドン錠10mg「NIG」	10mg1錠	ドンペリドン	内	後発品			室温
ナイキサン錠100mg	100mg1錠	ナブロキセン	内	先発品			室温
ナウゼリン坐剤60	60mg1個	ドンペリドン	外	先発品			室温
ナジフロキサンクリーム1%「SUN」	1%1g	ナジフロキサン	外	後発品	処		室温
ナファミキタット注射用50mg「SW」	50mg1瓶	ナファモスタットメチル酸塩	注		劇		室温
ナフトビジルOD錠75mg「DSEP」	75mg1錠	ナフトビジル	内	後発品	処		室温
ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルファン塩酸塩	内	先発品	麻劇処		室温
ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒドロモルファン塩酸塩	内	先発品	麻劇処		室温
ナルフライン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠	ナルフライン塩酸塩	内	後発品	劇		室温
ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	ヒドロモルファン塩酸塩	注	先発品	麻劇処		室温
ナルテンド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルファン塩酸塩	内	先発品	麻劇処		室温
ナルラビド錠4mg	4mg1錠	ヒドロモルファン塩酸塩	内	先発品	麻劇処		室温
ナロキサン塩酸塩j0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管	ナロキサン塩酸塩	注	先発品	劇		室温
ニカルジビン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	10mg10mL1管	ニカルジビン塩酸塩	注	★	劇		室温
ニカルジビン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL1管	ニカルジビン塩酸塩	注	後発品	劇		室温
ニコランジル錠5mg「サワイ」	5mg1錠	ニコランジル	内	後発品	処		室温
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	12mg1瓶	ニコランジル	注	後発品	処		冷所
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg1瓶	ニコランジル	注	後発品	処		冷所
ニセルゴリン錠5mg「トーア」	5mg1錠	ニセルゴリン	内	後発品	処		室温
ニゾラールクリーム2%	2%1g	ケトコナゾール	外	先発○			室温
ニゾラールローション2%	2%1g	ケトコナゾール	外	先発○			室温
ニドラン注射用50mg	50mg1瓶	ニムスチン塩酸塩	注	先発品	劇		室温
ニトロールRカプセル20mg	20mg1カプセル	硝酸イソルビド	内	先発○	処		室温
ニトロール持続静注25mgシリング	25mg50mL1管	硝酸イソルビド	注	先発品	処		室温
ニトロール注5mgシリング	5mg10mL1管	硝酸イソルビド	注	先発品	処		室温
ニトログリセリン静注25mg/L「TE」	25mg50mL1管	ニトログリセリン	注	後発品	劇		室温
ニトロダムTTS25mg	(25mg)10cm21枚	ニトログリセリン	外	先発品	劇		室温
ニトロベン西下錠0.3mg	0.3mg1錠	ニトログリセリン	内	後発品	劇		室温
ニフェジビンCR錠10mg「トーア」	10mg1錠	ニフェジビン	内	後発品	劇		室温
ニフェジビンCR錠20mg「トーア」	20mg1錠	ニフェジビン	内	後発品	劇		室温
ニフェジビンカプセル10mg「サワイ」	10mg1カプセル	ニフェジビン	内	後発品	劇		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
ニューモバックスNPシリジン	0.5mL1瓶	肺炎球菌ワクチン	注		劇処	生物	冷所
ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg1mL1キット	メボリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ネオアミュー輸液	200mL1袋	腎不全用アミノ酸製剤	注	先発品	処		室温
ネオアーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	シクロスボリン	内	先発○	劇処		室温
ネオシネジンコーコー5%点眼液	5%1mL	フェニレフリン塩酸塩	外				室温
ネオシネジンコーコー1mg	0.1%1mL1管	フェニレフリン塩酸塩	注		劇処		室温
ネオファーゲン静注20mL	20mL1管	グリチルリチン・グリシン・システィン配合剤	注	後発品	処		室温
ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1管	アミノフィリン水和物	注		処		室温
ネオメドロールEE軟膏	1g	ラジオマイシン硫酸塩・メチルブレニゾロ	外		処		室温
ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL	ネバフェナク	外	先発品	処		室温
ノイトロジン注100μg	100μg1瓶	レノグラスチム(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	室温
ノイロトロビン錠4単位	4単位1錠	ワクシニアウイルス接種家児炎症皮膚抽出液	内	先発品			室温
ノイロトロビン注射液3.6単位	3mL1管	ワクシニアウイルス接種家児炎症皮膚抽出液	注		処	生物	室温
ノーベルペール静注用250mg	250mg1瓶	フェノバルビタールナトリウム	注	先発品	劇向処		室温
ノバミン錠5mg	5mg1錠	プロクロルペラジンマレイン酸塩	内		処		室温
ノボラビッド注 フレックスベン	300単位1キット	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	注	先発○	劇処		冷所
ノリトリン錠10mg	10mg1錠	ノルトリブナリン塩酸塩	内	先発品	劇処		室温
ノルアドレナリン注1mg	0.1%1mL1管	ノルアドレナリン	注		劇処		室温
バーサビブ静注透析用シリジン2.5mg	2.5mg2mL1筒	エテルカルセチド塩酸塩	注	先発品	劇処		冷所
バージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	ペルツズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ハーセブテン注射用150	150mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	処	生物	冷所
ハーセブテン注射用60	60mg1瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	処	生物	冷所
ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg1錠	ジゴキシン	内		劇処		室温
バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン	内	後発品			室温
ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg1瓶	ノギテカン塩酸塩	注	先発品	劇処		室温
ハイカリックRF輸液	500mL1袋	高カリオリー輸液用基本液	注	先発品	処		室温
ハイポエタノール液2%「ニッコー」	10mL	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	外	後発品			室温
バキロビッドパック300	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル	内	先発品	劇処		室温
バキロビッドパック600	1シート	ニルマトレルビル・リトナビル	内	先発品	劇処		室温
バクトラン注	5mL1管	スルファメトキサゾール・トリメトブリム	注	先発品	処		室温
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg16.7mL1瓶	バクリタキセル	注	後発品	毒処		室温
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	バクリタキセル	注	★	毒処		室温
ハッカ油「コザカイ・M」	1mL	ハッカ油	内				室温
ハドセブ点滴静注用20mg	20mg1瓶	エンホルツマブ ベドテン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ハドセブ点滴静注用30mg	30mg1瓶	エンホルツマブ ベドテン(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ハバペリン塩酸塩40mg「日医工」	4%1mL1管	ハバペリン塩酸塩	注		処		室温
ハビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1管	ファリシマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ハセオ錠150mg	150mg1錠	ハセオヌットラスト	内	先発品	劇処		室温
ハブトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位100mL1瓶	人ハブトグロビン	注		処	特生	冷所
ハベントオ点滴静注200mg	200mg10mL1瓶	アルベルマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ハム静注500mg	2.5%20mL1管	ブラリドキシムヨウ化物	注		処		室温
ハラグーン静注1mg	1mg2mL1瓶	エリブリソニン塩酸塩	注	先発○	毒処		室温
バラシクロビル錠500mg「トーワ」	500mg1錠	バラシクロビル塩酸塩	内	後発品	処		室温
バラシクロビル顆粒50%〔SPKK〕	50%1g	バラシクロビル塩酸塩	内	後発品	処		室温
バルタジンM錠0.125mg	0.125mg1錠	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	内		劇処		室温
バルタジンM錠0.2mg	0.02%1mL1管	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	注	後発品	劇処		室温
バルプロ酸ナトリウムシップ5%「DSP」	5%1mL	バルプロ酸ナトリウム	内	後発品	処		室温
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	内	★	処		室温
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	内	後発品	処		室温
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	200mg1錠	バルプロ酸ナトリウム	内	★	処		室温
バルミコト200μgタービュヘイラ-56吸入	11.2mg1瓶(200μg)	ブデソニド	外	先発品	処		室温
バルミコト吸入液0.5mg	0.5mg2mL1管	ブデソニド	外	先発○	処		室温
バルモディア錠0.1mg	0.1mg1錠	ベマフィラート	内	先発品	処		室温
ハルロビテープ24mg	24mg1枚	ロビニロール塩酸塩	外	先発品	劇処		室温
ハルロビテープ8mg	8mg1枚	ロビニロール塩酸塩	外	先発品	劇処		室温
バル筋注100mg「AFP」	10%1mL1管	ジメルカブロール	注		処		冷所
パロキセチン錠10mg〔VTRS〕	10mg1錠	パロキセチン塩酸塩水和物	内	後発品	劇処		室温
パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL1袋	パロノセトロン塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
ハロベリードール細粒1%「ヨントミ」	1%1g	ハロベリードール	内	後発品	劇処		室温
ハロベリードール0.75mg「ヨントミ」	0.75mg1錠	ハロベリードール	内	後発品	劇処		室温
ハロベリードール3mg「ヨントミ」	3mg1錠	ハロベリードール	内	後発品	劇処		室温
パンコマイシン塩酸塩0.5g「明治」	500mg1瓶	パンコマイシン塩酸塩	内		処		室温
パンコマイシン点滴静注用0.5g「トーワ」	0.5g1瓶	パンコマイシン塩酸塩	注		処		室温
パントル注射液250mg	250mg1管	パンテノール	注		処		室温
パントシン散20%	20%1g	パンテチン	内	準先発			室温
ハンブ注射用1000	1,000 μg1瓶	カルベリチド(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処		室温
ヒアルロン酸Na0.5眼粘弾剤1%MV「センジュ」	1%0.5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	外	後発品			冷所
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%HV「センジュ」	1%0.85mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	外	★			冷所
ヒアルロン酸Na関節注25mgシリジン「NP」	1%2.5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	注	後発品	処		室温
ヒアルロン酸ナトリウムFP点眼液0.1%「日点」	0.1%5mL1瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム	外	後発品			室温
ピーエヌスプラス500眼灌流液0.0184%	0.46%20mL1瓶(希釈液付)	オキシギルタオノン	外	先発品			室温
ピーフリード輸液	500mL1キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	注	先発品	劇処		室温
ピームゲン注0.25mL	0.25mL1瓶	組換え沈降型肝炎ワクチン	注		劇処		冷所,遮光
ピームゲン注0.6mL	0.5mL1瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン	注		劇処		冷所
ヒーロン眼粘弾剤2.3%シリジン0.6mL	2.3%0.6mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム	外	先発品			冷所
ビッグラップ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	クラゾンセタノンナトリウム	注	先発品	劇処		室温
ビオグリタゾン錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ビオグリタゾン塩酸塩	内	後発品	処		室温
ビオスリー配合OD錠	1錠	酪酸菌配合剤	内				室温
ビオフェルミンR散	1g	耐性乳酸菌製剤	内	後発品			室温
ビカネイト輸液	1L1袋	重炭酸リソングル	注	先発品	処		室温
ピカルタミドOD錠80mg「サワイ」	80mg1錠	ピカルタミド	内	後発品	劇処		室温
ピクシリソル注射用1g	1g1瓶	アンビシリソナトリウム	注		処		室温
ピクトーザ皮下注18mg	18mg3mL1キット	リラグルチド(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処		冷所
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウム水和物	内	後発品			室温
ヒセオゼル配合点滴静注	200mL1袋	濃グリセリン・果糖	注	★	処		室温
ビシバニール注射用1KE	1KE1瓶	活連菌抽出物	注	先発品	劇処	生物	冷所
ビンバニール注射用5KE	5KE1瓶	活連菌抽出物	注	先発品	劇処	生物	冷所
ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン	外	後発品			冷所
ビソノテープ4mg	4mg1枚	ビソプロロール	外	先発品	処		室温
ビンプロロールフルマル酸塩0.625mg「トーワ」	0.625mg1錠	ビンプロロールフルマル酸塩	内	★	処		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
ビソプロロールフルマーフル酸塩2.5mg「トーア」	2.5mg1錠	ビソプロロールフルマーフル酸塩	内	後発品	処		室温
ビソプロロールフルマーフル酸塩錠5mg「日医工」	5mg1錠	ビソプロロールフルマーフル酸塩	内	後発品	処		室温
ビタシン注射液500mg	500mg1管	アスコルビン酸	注		処		冷所
ビタダン配合錠	1錠	フルスルチアミン・B2・B6・B12配合剤	内	後発品	処		室温
ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーア」	1mg1錠	ビタバスタチンカルシウム	内	後発品	処		室温
ビタメジン静注用	1瓶	リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤	注		処		室温
ビダラシン軟膏3%「SW」	3%1g	ビダラビン	外	後発品			室温
ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg1瓶(溶解液付)	コルチコレリン(ヒト)	注	先発品	処		室温
ビドキサール錠10mg	10mg1錠	ビドキサールリン酸エステル水和物	内				室温
ビトレシン注射液20	20単位1管	バソプレシン	注		処		冷所
ビノルビン注射用30mg	30mg1瓶	ビラルビン塩酸塩	注	先発品	劇処		室温
ビマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	ビマリシン	外	先発品	処		室温
ビムバット錠50mg	50mg1錠	ラコサミド	内	先発○	劇処		室温
ビムバット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	ラコサミド	注	先発品	劇処		室温
ビモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠	ビモベンダン	内	後発品	処		室温
ヒューマリンR100単位/mL	100単位1mLバイアル	インスリンヒト(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処		冷所,冷蔵
ヒューマングルタミリオペン	300単位1キット	インスリンリスプロ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇処		冷所,冷蔵
ビラマイド原来	1g	ビラジナミド	内		処		室温
ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「NIG」	50mg1カプセル	ビルシカイニド塩酸塩水和物	内	後発品	劇処		室温
ビルダグリブチン錠50mg「トーア」	50mg1錠	ビルダグリブチン	内	後発品	処		室温
ヒルドイドローション0.3%	1g	ヘパリン類似物質	外	準先発			室温
ヒルナミン細粒10%	10%1g	レボメプロマジンマレイン酸塩	内		劇処		室温
ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩	内		処		室温
ヒルナミン錠(5mg)	5mg1錠	レボメプロマジンマレイン酸塩	内		処		室温
ビレーズトリエアロスマフィア120吸入	120吸入1キット	ブデソニド・グリコロニウム臭化物・ホルモナ	外	先発品	処		室温
ビレスコ200mg	200mg1錠	ビルフェニドン	内	先発○	劇処		室温
ビレチア細粒10%	10%1g	ブロメタジンメチレンジシリル酸塩	内		劇		室温
ビレテフ錠(25mg)	25mg1錠	ブロメタジン塩酸塩	内				室温
ビロイ点滴静注用100mg	100mg1瓶	ゾルベキシマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ファセラ皮下注30mgシリジ	30mg1mL1筒	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ファセンラ皮下注30mgペニ	30mg1mL1キット	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ファモチジンD錠10mg「EMEC」	10mg1錠	ファモチジン	内	後発品			室温
ファモチジンD錠20mg「EMEC」	20mg1錠	ファモチジン	内	後発品			室温
ファモチジン散10%「サワイ」	10%1g	ファモチジン	内	後発品			室温
ファモチジン静注液20mg「サワイ」	20mg20mL1管	ファモチジン	注	後発品	処		室温
ファンギソジンロップ100mg/mL	100mg1mL	アムホテリンB	内	先発品	劇処		室温
フィアスチブ フレックスタッチ	300単位1キット	インスリンアスパルト(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処		冷所
フィコソイ錠2mg	2mg1錠	ペランバネル水和物	内	先発品	処		室温
フィコンバ点滴静注用2mg	2mg1瓶	ペランバネル水和物	注	先発品	処		室温
フィジオ140輸液	500mL1袋	酢酸リゲル液(ブドウ糖加)	注	先発品	処		室温
フィジオソル3号輸液	500mL1袋	維持液	注		処		室温
フィプラストスプレー-500	500μg1瓶(溶解液付)	トラフェルミン(遺伝子組換え)	外	先発品	処		冷所
フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g1瓶(溶解液付)	乾燥人フィブリノゲン	注		処	特生	冷所
フィブリガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子	注		処	特生	冷所
フィルグラスマスBS75μgシリジ「F」	75μg0.3mL1筒	フィルグラスマス(遺伝子組換え)	注	後発品	処		冷所
フェイクシート静注500mg	500mg10mL1瓶	カルボキシマルトース第二鉄	注	先発品	処		室温
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーア」	5%1g	フェキソフェナジン塩酸塩	内	後発品			室温
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーア」	60mg1錠	フェキソフェナジン塩酸塩	内	後発品			室温
フェンジン静注40mg	40mg2mL1管	含糖酸化鉄	注		処		室温
フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	ペルツスマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	ペルツスマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	フルペストラント	注	先発品	劇処		冷所
フェトロジア点滴静注用1g	1g1瓶	セファドロコトキシル酸塩硫酸塩水和物	注	先発品	処		冷所
フェノバルエリキシル0.4%	0.4%1mL	フェノバルビタール	内		劇向処		室温
フェノバル散10%	10%1g	フェノバルビタール	内		劇向処		室温
フェノバル錠30mg	30mg1錠	フェノバルビタール	内		劇向処		室温
フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルビタール	注		劇向処		室温
フェブキソスタット錠10mg「JG」	10mg1錠	フェブキソスタット	内	後発品	処		室温
フェロ・グラデュメット錠105mg	105mg1錠	乾燥硫酸鉄	内				室温
フェペリノ配合錠	1錠	ペルベリン塩化物水和物・ゲンショウコエキ	内	準先発			室温
フェロア粒8.3%	1g	ケエン酸第II鉄ナトリウム	内	先発品			室温
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	フェンタニルクエン酸塩	注	後発品	麻劇処		室温
フェントステープ1mg	1mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	外	先発○	麻劇処		室温
フェントステープ2mg	2mg1枚	フェンタニルクエン酸塩	外	先発○	麻劇処		室温
フォシーガ錠10mg	10mg1錠	タバグリフロジンプロビレングリコール水和物	内	先発品	処		室温
フォシーガ錠5mg	5mg1錠	タバグリフロジンプロビレングリコール水和物	内	先発○	処		室温
フォリクリン錠	5mg1錠	葉酸	内				室温
プロラム口腔用液2.5mg	2.5mg0.5mL1筒	ミダゾラム	外	先発品	向処		室温
プロラム口腔用液5mg	5mg1mL1筒	ミダゾラム	外	先発品	向処		室温
ブスコパン錠10mg	10mg1錠	ブチルスコポラミン臭化物	内				室温
ブスコパン注20mg	2%1mL1管	ブチルスコポラミン臭化物	注		劇処		室温
ブライアン点滴静注1g	20%5mL1管	エデト酸カルシウムナトリウム水和物	注		処		室温
ブラザサカカゼル110mg	110mg1カプセル	タピガトランエキシラートメタンスルホン酸塩	内	先発品	処		室温
ブラザキサカカゼル75mg	75mg1カプセル	タピガトランエキシラートメタンスルホン酸塩	内	先発品	処		室温
フランジル内服錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール	内		処		室温
フランジル錠250mg	250mg1錠	メトロニダゾール	外				室温
プラスチース	10g	ボリエチレン樹脂・流動パラフィン	外				室温
プラノバル配合錠	1錠	ノルゲストレル・エチニルエストラジオール	内	先発品	処		室温
プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	10mg1錠	プラバスタチンナトリウム	内	後発品	処		室温
プラリアル皮下注60mgシリジ0.5mL	60mg0.5mL1管	テノスマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ブランルカストカプセル112.5mg「日医工」	112.5mg1カプセル	ブランルカスト水和物	内	後発品			室温
ブランルカストドライシロップ10%「AFP」	10%1g	ブランルカスト水和物	内	後発品			室温
ブリビアクト錠25mg	25mg1錠	ブリーバラセタム	内	先発品	処		室温
ブリビアクト静注25mg	25mg2.5mL1瓶	ブリーバラセタム	注	先発品	処		室温
ブリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	イダルシマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	冷凍
ブリビズ波0.05%	0.05%1mL	ナファゾリン硝酸塩	外				室温
ブリミドン細粒99.5%「日医工」	99.5%1g	ブリミドン	内		処		室温
フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	フルオレセイン	注	後発品	処		室温
フルオロウラシル注1000mg「トーア」	1,000mg1瓶	フルオロウラシル	注	後発品	劇処		冷所
フルオロウラシル注250mg「トーア」	250mg1瓶	フルオロウラシル	注	★	劇処		冷所

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
フルオロメトロン点眼液0.02%「日点」	0.02%1mL	フルオロメトロン	外	後発品			室温
フルオロメトロン点眼液0.1%「NIT」	0.1%1mL	フルオロメトロン	外	後発品			室温
フルコナソールカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	フルコナゾール	内	★	処		室温
フルタイド100μgエアゾール60吸入用	11.67mg7.0g1瓶	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	外	先発品	処		室温
フルタイド100ディスカス	100μg60ブリスター1個	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	外	先発品	処		室温
フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」28噴霧用	2.04mg4ml1瓶	フルチカゾンプロピオニ酸エステル	外	★			室温
フルティフォーム125エアゾール6吸込用	56吸込1瓶	フルチカゾンプロピオニ酸エステル・ホルモテ	外	先発品	処		室温
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	1mg1錠	フルニトラゼパム	内	後発品	向処		室温
フルフェン錠100	100mg1錠	イブプロフェン	内	先発品			室温
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	25mg1錠	フルボキサミンマレイン酸塩	内	後発品	処		室温
フルマゼル注射液0.5mg「F」	0.5mg5mL1管	フルマゼル	注	後発品	劇処		室温
ブレアミンP注射液	200mL1袋	高カロリー輸液用結合アミノ酸製剤	注	先発品	処		室温
ブレオ注射用15mg	15mg1瓶	ブレオマイシン塩酸塩	注	先発品	劇処		冷所
フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	50mg1錠	フレカイニド酢酸塩	内	後発品	劇処		室温
フレガバリンOD錠25mg「トーウ」	25mg1錠	フレガバリン	内	後発品	処		室温
フレガバリンOD錠75mg「トーウ」	75mg1錠	フレガバリン	内	後発品	処		室温
フレグランシーン座剤1mg	1mg1個	メプロスト	外	先発品	劇処		冷所
フレドニゾン錠「タケダ」1%	1%1g	フレドニゾロン	内	処			室温
フレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	フレドニゾロン	内	処			室温
フレドニゾン錠5mg	5mg1錠	フレドニゾロン	内	処			室温
フレドニマ注臍20mg	20mg1個	フレドニゾンリソニン酸エステルナトリウム	外	後発品	処		室温
フレベナーザ2.0水性懸濁液[冷所]	0.5mL1キット	沙降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異)注			劇処	生物	2~8°Cで保存
プロウペス腹用剤10mg	10mg1個	ジノプロストン	外		劇処		-20°C以下
フローリース眼検査用試験紙0.7mg	1枚	フルオレセインナトリウム	外	処			室温
プロクトセティル軟膏	1g	ヒドロコルチゾン・フライオマイシン配合剤	外				室温
プロガラボー筋注125mg	125mg1管	ヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル	注	処			室温
プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶	ホスフルコナゾール	注	先発品	処		冷所
フロジン外用液5%	5%1mL	カルプロニム塩化物	外	後発品			室温
プロスタンティン軟膏0.003%	0.003%1g	アルプロスタジルアルファデクス	外	先発品	劇処		室温
フロセキトミ細粒4%「EMEC」	4%1g	フロセミド	内	処			室温
フロセミド錠10mg「NIG」	10mg1錠	フロセミド	内	後発品	処		室温
フロセキトミ錠20mg「NIG」	20mg1錠	フロセミド	内	後発品	処		室温
フロセミド錠40mg「NIG」	40mg1錠	フロセミド	内	後発品	処		室温
フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管	フロセミド	注	後発品	処		室温
プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管	I-ソブレナリン塩酸塩	注		劇処		室温
プロタノン硫酸塩注100mg「モチダ」	1%10mLバイアル	プロタミン硫酸塩	注	処			室温
プロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」	0.25mg1錠	プロチゾラム	内	後発品	向処		室温
プロチゾリン酒石酸塩注射液0.5mg「SW」	0.5mg1管	プロチレリン酒石酸塩水和物	注	後発品	処		室温
プロトビック軟膏0.1%	0.1%1g	タクロリムス水和物	外	先発○	劇処		室温
プロバジル錠50mg	50mg1錠	プロビルチオラシル	内	処			室温
プロハンス静注20mL	20mL1瓶	ガドリドール	注	先発品	処		室温
プロビレングリコール(丸石)	10mL	プロビレングリコール	外				室温
プロプラ/ロール塩酸塩錠10mg「トーウ」	10mg1錠	プロプラノロール塩酸塩	内	後発品	劇処		室温
プロペト	10g	白色ワセリン	外				室温
プロボフォール静注1%100mL「マルイシ」	1g100mL1瓶	プロボフォール	注		劇処		室温
プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管	プロボフォール	注		劇処		室温
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL	プロムヘキシン塩酸塩	外	後発品			室温
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーウ」	4mg1錠	プロムヘキシン塩酸塩	内	後発品			室温
プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	0.2%2mL1管	プロムヘキシン塩酸塩	注	後発品	処		室温
プロモクリプチジン錠2.5mg「F」	2.5mg1錠	プロモクリプチジンメチル酸塩	内	後発品	劇処		室温
フロリードゲル経口用2%	2%1g	ミコナゾール	内	先発品	処		室温
フロリネキ錠0.1mg	0.1mg1錠	フルドロコルチゾン酢酸エステル	内	先発品	劇処		室温
ペイフォーナース筋注100mgシリソジ	100mg1mL1筒	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	冷所
ペイフォーナース筋注50mgシリソジ	50mg0.5mL1管	ニルセビマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	冷所
ペオーナー錠50mg	50mg1錠	ビペグロン	内	先発品	処		室温
ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0.05mL1管	プロルシズマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処		冷所
ペクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ハニツムマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	3.6mg0.36mL1筒	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	注	後発品	処		冷所
ペクリリ点滴静注用100mg	100mg1瓶	レムデシビル	注	先発品	処		室温
ペサコリン散5%	5%1g	ペタネコール塩化物	内		劇		室温
ペザフィーブラートSR錠200mg「サワイ」	200mg1錠	ペザフィーブラート	内	後発品	処		室温
ペタヒスチメンシル酸塩錠6mg「日医工P」	6mg1錠	ペタヒスチメンシル酸塩	内	後発品	処		室温
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	3.5%5mL1管	ペチジン塩酸塩	注		麻処		室温
ペチロルファン配合HD錠	1mL1管	ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩	注		麻処		室温
ペニジン塩酸塩錠4mg「NIG」	4mg1錠	ペニジン塩酸塩	内	後発品	劇処		室温
ペネシッド錠250mg	250mg1錠	プロベネシド	内	処			室温
ペネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL	サルブタモール硫酸塩	外	先発品	処		室温
ペノキシール点滴液0.4%	0.4%1mL	オキシブロカイン塩酸塩	外	先発品			室温
ペバシズマブB5点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶	ペバシズマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処	生物	冷所
ペバリンNa・ク用10単位/mLシリソジ10mL	100単位10mL1管	ペバリンナトリウム	注	処	生物		室温
ペバリンNa透析用250単位/mLシリソジ20mL「フソー」	5,000単位20mL1管	ペバリンナトリウム	注	処	生物		室温
ペバリカルシウム皮下5千単位/0.2mLシリソジ「モチダ」	5,000単位0.2mL1管	ペバリカルシウム	注	後発品	処	生物	室温
ペバリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」	5,000単位5mL1瓶	ペバリンナトリウム	注	後発品	処	生物	室温
ペバリン類似物質膏性クリーム0.3%「日医工」	1g	ペバリン類似物質	外	後発品			室温
ペブリジン塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	ペブリジン塩酸塩水和物	内	後発品	劇処		室温
ペメトキセド点滴静注液100mg「トーウ」	100mg4mL1瓶	ペメトキセドナトリウムヘミベント水和物	注	後発品	劇処		室温
ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーウ」	500mg20mL1瓶	ペメトレキセドナトリウムヘミベント水和物	注	後発品	劇処		室温
ペメトレキセド点滴静注液800mg「トーウ」	800mg32mL1瓶	ペメトレキセドナトリウム水和物	注	後発品	劇処		室温
ペラバミル塩酸塩錠5mg「NIG」	40mg1錠	ペラバミル塩酸塩	内	後発品	処		室温
ペラバミル塩酸塩錠2.5mL	2.5mg1錠	ペラバミル塩酸塩	注	後発品	劇処		室温
ペリキューポ錠	1g	ペルイシグアト	内	先発品	処		室温
ペリチーム配合顆粒	1g	脾臓性消化酵素配合剤	内				室温
ペリプラスTPコンビセッット 組織接着用	0.5mL2キット1組	フィブリノゲン加第XII因子	外	先発品	処	特生	冷所
ペリプラスTPコンビセッット 組織接着用	3mL2キット1組	フィブリノゲン加第III因子	外	先発品	処	特生	冷所
ペリプラスTPコンビセッット 組織接着用	5mL2キット1組	フィブリノゲン加第IX因子	外	先発品	処	特生	冷所
ペルソムア錠15mg	15mg1錠	スペロキサント	内	先発品	処		室温
ペルソムラ錠20mg	20mg1錠	スペロキサント	内	先発品	処		室温
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	4mg1錠	ペロスピロン塩酸塩水和物	内	後発品	劇処		室温
ベンザリン錠2	2mg1錠	ニトラゼバム	内		向処		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
ベンザリノ錠5	5mg1錠	ニトラゼバム	内	準先発	劇		室温
ベンレスステープ18mg	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカイン	外	先発○	劇		室温
ポートラーザ点滴静注液800mg	800mg50mL1瓶	ネシツムマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	0.2mg1錠	ボグリボース	内	後発品	劇		室温
ホストイ静750mg	750mg10mL1瓶	ホスフェニトインナトリウム水和物	注	先発品	劇		室温
ホスホマイシンNa静注用1g「タカタ」	1g1瓶	ホスホマイシンナトリウム	注	先発品	劇		室温
ホスミシンドライシロップ400	400mg1g	ホスホマイシンカルシウム水和物	内	先発品	劇		室温
ホスミシン錠500	500mg1錠	ホスホマイシンカルシウム水和物	内	先発品	劇		室温
ボスマニ外用液0.1%	0.1%1mL	アドレナリン	外				室温
ボスマシン注1mg	0.1%1mL1管	アドレナリン	注		劇		室温
ホスピリゾ配合顆粒	100mg1包(1錠として)	リソニ酸二水素ナトリウム・水和物・無水リソニ酸	内	先発品	劇		室温
ボックス注射100単位	100単位1瓶	A型ボツリヌス毒素	注	先発品	毒	生物	冷所
ボックス注射用50単位	50単位1瓶	A型ボツリヌス毒素	注	先発品	毒	生物	冷所
ボビドンショード外用液10%「イワキ」	10%10mL	ボビドンショード	外	後発品			室温
ボビヨドンガーブル7%	7%1mL	ボビドンショード	外				室温
ボビヨドングル10%	10%10g	ボビドンショード	外	後発品			室温
ボビヨンスクラフ7.5%	7.5%10mL	ボビドンショード	外	後発品			室温
ボブスカイ0.5%注50mg/10mL	50mg10mL1管	塩酸レボピバクイン	注	先発品	劇		室温
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	ボラブレジン	内	後発品			室温
ボララミン錠2mg	2mg1錠	d-クロロフェニラミンマレイン酸塩	内				室温
ボララミン注5mg	0.5%1mL1管	クロロフェニラミンマレイン酸塩	注	先発品	劇		室温
ボリストチレンスルホン酸Ca経口ゼリ-20%分包25g「三和」	20%25g1個	ボリストチレンスルホン酸カルシウム	内	後発品			室温
ホリゾン錠5mg	5mg1錠	ジアゼバム	内	準先発	劇		室温
ホリゾン注射液10mg	10mg1管	ジアゼバム	注	先発品	劇		室温
ボルタレンゲル1%	1%1g	ジクロフェナカナトリウム	外	先発○			室温
ボルヒール組織接着用	0.5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XII因子	外	先発品	劇	特生	冷所
ボルヒール組織接着用	3mL4瓶1組	フィブリノゲン加第III因子	外	先発品	劇	特生	冷所
ボルヒール組織接着用	5mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子	外	先発品	劇	特生	冷所
ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	ヒドロキシエチルデンブン130000	注	先発品	劇		室温
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	ブビパカイン塩酸塩水和物	注	先発品	劇		室温
マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	ブビパカイン塩酸塩水和物	注	先発品	劇		室温
マイザ-軟膏0.05%	0.05%1g	ジフルプレドナート	外	先発品			室温
マイスタン錠5mg	5mg1錠	クロバザム	内	先発品	劇		室温
マイドン注射液10mg	10mg1管	マイドン	外	先発品	劇		室温
マイドン注射用50g	68%50g1包	クエン酸マグネシウム	内	先発品	劇		室温
マグセント注100mL	100mL1瓶	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖	注	先発品	劇		室温
マクロゴール軟膏*(日興製薬)	10g	マクロゴール	外				室温
マドバ-配合錠100	1錠	レボドバ・ベンセラジド塩酸塩	内	先発品	劇		室温
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	10mg1錠	マプロチリン塩酸塩	内	★	劇		室温
マンジヤロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1キット	チルゼバチド	注	先発品	劇		冷所
マンジヤロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キット	チルゼバチド	注	先発品	劇		冷所
マンニコトT注15%	15%500mL1袋	D-マンニコトール	注	先発品	劇		室温
マンニットール-S注射液	300mL1袋	D-ソルビトール・D-マンニコトール	注	先発品	劇		室温
ミールビック[冷所]	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	注		劇	生物	5°C以下で保存
ミオコルスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	ニトログリセリン	外	先発品	劇		室温
ミオテクター冠血管注	1瓶1管1組	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤	注	先発品	劇		室温
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	50mg1錠	ミカファンギンナトリウム	注	後発品	劇		室温
ミグリトルOD錠50mg「トーワ」	50mg1錠	ミグリトル	内	後発品	劇		室温
ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	ミダゾラム	注		劇		室温
ミダフレッサ静注0.1%	10mg10mL1瓶	ミダフレッサ	注	先発品	劇		室温
ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」	5mg1錠	ミチグリニドカルシウム水和物	内	後発品	劇		室温
ミティキュア二舌下錠10,000AUJ	10,000AUJ1錠	アレルゲンエキス	内	先発品	劇		室温
ミティキュア二舌下錠3,300AUJ	3,300AUJ1錠	アレルゲンエキス	内	先発品	劇		室温
ミニリンメトルド錠60μg	60μg1錠	デスマブレン酢酸塩水和物	内	先発品	劇		室温
ミニネオ錠2.5mg	2.5mg1錠	エサキセレノン	内	先発品	劇		室温
ミネラミック注	2mL1管	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	注	後発品	劇		室温
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩	内	★	劇		室温
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミノサイクリン塩酸塩	内	★	劇		室温
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg1瓶	ミノサイクリン塩酸塩	注	先発品	劇		室温
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	20mg1g	ミノサイクリン塩酸塩	内	先発品	劇		室温
ミヤBM細粒	1g	酪酸菌製剤	内				室温
ミヤBM錠	1錠	酪酸菌製剤	内				室温
ミラクリッド注射液10万単位	100,000単位2mL1管	ワリナスタチン	注	先発品	劇	生物	室温
ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL1管	ワリナスタチン	注	先発品	劇	生物	室温
ミラベックスL4錠1.5mg	1.5mg1錠	ラミベキソール塩酸塩水和物	内	先発○	劇		室温
ミリブラ動注用70mg	70mg1瓶	ミリブラチン水和物	注	先発品	劇		冷所
ミリブラ懸滴用液4mL	4mL1管	ヨード化ケン油脂脂肪酸エチルエステル	注	先発品	劇		室温
ミルセラ注シリジン100μg	100μg0.3mL1筒	エボエチンベータベゴル(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
ミルセラ注シリジン250μg	250μg0.3mL1筒	エボエチンベータベゴル(遺伝子組換え)	注	先発品	劇	生物	冷所
ミルタザピン錠15mg「杏林」	15mg1錠	ミルタザピン	内	後発品	劇		室温
ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL1管	ミルリノン	注	後発品	劇		室温
ミレーナ52mg	1個	レボノルゲストレル	外	先発品	劇		室温
ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	I-メントール	内	先発品	劇		室温
メイロノ新注8.4%	8.4%20mL1管	庚酸水素ナトリウム	注	先発品	劇		室温
メイロノ静注8.4%	8.4%250mL1袋	庚酸水素ナトリウム	注	先発品	劇		室温
メキシチルカバセル50mg	50mg1カバセル	メキシレチン塩酸塩	内	先発○	劇		透光、気密
メコバラミン錠500「トーワ」	0.5mg1錠	メコバラミン	内	後発品			室温
メサデルム軟膏0.1%	0.1%1g	テキサメタゾンプロピオニ酸エステル	外	先発○	劇		室温
メサラジン錠500mg「ケミファ」	500mg1錠	メサラジン	内	後発品	劇		室温
メジコン錠15mg	15mg1錠	テキストロメトロリソルファン奥化水素酸塩水和物	内	準先発			室温
メストレキセト点滴静注液1000mg	1,000mg40mL1瓶	メストレキサート	注	先発品	劇		室温
メストレキセト点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	メストレキサート	注	先発品	劇		室温
メチコバール細粒0.1%	0.1%500mg1包	メコバラミン	内	後発品			室温
メチルジギシキン錠0.1mg「NIG」	0.1mg1錠	メチルジギシキン	内	後発品	劇		室温
メトクロラミド錠5mg「トーワ」	5mg1錠	メトクロラミド	内	後発品			室温
メトクロラミド注10mg「NIG」	0.5%2mL1管	塩酸メトクロラミド	注	後発品	劇		室温
メトレキサート錠2mg「トーワ」	2mg1錠	メトレキサート	内	後発品	劇		室温
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	メプロロール酒石酸塩	内	後発品	劇		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	250mg1錠	メトホルミン塩酸塩	内	★	劇処		室温
メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	500mg1錠	メトホルミン塩酸塩	内	★	劇処		室温
メナテトレーンカプセル15mg「トーワ」	15mg1カプセル	メナテトレノン	内	後発品			室温
メブチンエーアー10μg吸入100回	0.0143%5mL1キット	プロカテロール塩酸塩水和物	外	先発品	処		室温
メブチンロップμg/mL	0.0005%1mL	プロカテロール塩酸塩水和物	内	先発○			室温
メブチニミニ錠25μg	0.005%1g	プロカテロール塩酸塩水和物	内	先発品			室温
メブチン吸入液0.01%	0.01%1mL	プロカテロール塩酸塩水和物	外	先発品	処		室温
メブチン吸入液ユニック0.3mL	0.01%0.3mL1個	プロカテロール塩酸塩水和物	外	先発品	処		室温
メマンチジン塩酸塩OD錠5mg「杏林」	5mg1錠	メマンチジン塩酸塩	内	後発品	劇処		室温
メルカゾール錠5mg	5mg1錠	チアマゾール	内	処			室温
メルカゾール注射液10mg	10mg1管	チアマゾール	注	処			室温
メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	500mg1瓶	メロペネム水和物	注	★	処		室温
モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	1%1g	モサブリドクエン酸塩水和物	内	後発品			室温
モサブリドクエン酸塩錠5mg「VTRS」	5mg1錠	モサブリドクエン酸塩水和物	内	★			室温
モノヴァー静注500mg	500mg5mL1瓶	デルイソマルトース第二鉄	注	先発品	処		室温
モビコル配合内用剤LD	6.8523g1包	マクロコール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム配合剤	内	先発品	処		室温
モビプレックス配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤	内	先発品			室温
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	5mg10g1瓶	モメタゾンフランカルボン酸エヌステル水和物	外	後発品			室温
モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物	注		麻劇処		室温
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管	モルヒネ塩酸塩水和物	注		麻劇処		室温
モンテルカルストOD錠10mg「タカタ」	10mg1錠	モンテルカルストトリウム	内	後発品			室温
ヤーボイ点滴静注液20mg	20mg4mL1瓶	イビリマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	イビリマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ユーエフティ配合カプセルT100	100mg1カプセル(テガフール相当)	テガフール・ウラシル	内	先発品	劇処		室温
ユービット錠100mg	100mg1錠	尿素(13C)	内	先発品	処		室温
ユーロジン2mg錠	2mg1錠	エスタゾラム	内	先発○	向処		室温
ユニタクリク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶	滅菌調整タルク	注	先発品	処		室温
ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	10mg1錠	コビデカレノン	内	後発品			室温
ユブリズナ点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	イネビリマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ユベラNカプセル100mg	100mg1カプセル	トコフェロールニコチン酸エヌステル	内	准先発			室温
ユリス錠1mg	1mg1錠	ドヌラド	内	先発品	処		室温
ヨウ化カリウム「ホエイ」	1g	ヨウ化カリウム	内		剝		室温
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	ヨウ化カリウム	内				室温
ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリンデグルデク(遺伝子組換え)・インスリ	注	先発品	劇処		冷所
ライブリバント点滴静注350mg	350mg7mL1瓶	アミバンタマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	ラクツロース	内	★			室温
ラクツックG輸液	500mL1袋	乳酸リングル液(ソルビトール加)	注	処			室温
ラクテック注	500mL1袋	乳酸リングル液	注	処			室温
ラクテック注	11.1袋	乳酸リングル液	注	処			室温
ラゲブリオカプセル200mg	200mg1カプセル	モルスピラビリル	内	先発品	劇処		室温
ラコールNF配合経腸用液	10mL	経腸成分栄養剤	内	先発品			室温
ラシックス注20mg	20mg1管	フロセミド	注	処			室温
ラズクルーズ錠240mg	240mg1錠	ラゼルチニブメル酸塩水和物	内	先発品	劇処		室温
ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」	0.005%1mL	ラタノプロスト	外	後発品	処		室温
ラニビズマブBSA子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg/0.05mL1筒	ラニビズマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	劇処		冷所
ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋	ペラミビル水和物	注	先発品	処		室温
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	内	後発品			室温
ラメルテオラン錠8mg「武田テバ」	8mg1錠	ラメルテオラン	内	後発品	処		室温
ラモトリギン錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ラモトリギン	内	後発品	劇処		室温
ラロキシフェン塩酸塩60mg「トーワ」	60mg1錠	ラロキシフェン塩酸塩	内	後発品	処		室温
ラソソブラゾールOD錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ラソソブラゾール	内	後発品			室温
ランマーク皮下注120mg	120mg1.7mL1瓶	デスマスマ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
リーパクト配合顆粒	4.15g1包	イソロイシン・ロイシン・バリン	内	先発品			室温
リオナ錠250mg	250mg1錠	クエン酸第二鉄水和物	内	先発品	処		室温
リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物	内	先発品	処		室温
リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エドキサバントシル酸塩水和物	内	先発品			室温
リコモジュリン点滴静注用12800	12,800単位1瓶	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)	注	先発品	処	生物	室温
リザベカプセル100mg	100mg1カプセル	トラニラスト	内	先発○			室温
リスペリドン錠1mg「アメル」	1mg1錠	リスペリドン	内	後発品	劇処		室温
リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	0.1%0.5mL1包	リスペリドン	内	後発品	劇処		室温
リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	0.1%1mL1包	リスペリドン	内	後発品	劇処		室温
リスミニ錠2mg	2mg1錠	リルマザホン塩酸塩水和物	内	先発品			室温
リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	リソキシマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	処	生物	冷所
リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	リソキシマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	処	生物	冷所
リツキシマブBSA点滴静注100mg「ファイザー」	100mg10mL1瓶	リソキシマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	処	生物	冷所
リツキシマブBSA点滴静注500mg「ファイザー」	500mg50mL1瓶	リソキシマブ(遺伝子組換え)	注	後発品	処	生物	冷所
リドカイン静注用2%シリソジ「テレモ」	2%5mL1筒	リドカイン	注	後発品	劇処		室温
リドリドン塩酸塩点滴静注液50ml「日医工」	1%5mL1管	リドリドン塩酸塩	注	後発品	劇処		冷所
リドメックスコーウローション0.3%	0.3%1g	ブレドニゾロン吉草酸エヌステル酢酸エヌステル	外	先発品			室温
リドメックスコーウローション0.3%	0.3%1g	ブレドニゾロン吉草酸エヌステル酢酸エヌステル	外	先発○			室温
リバーロキサバントOD錠10mg「バイエル」	10mg1錠	リバーロキサバント	内	後発品	処		室温
リバーロキサバントOD錠15mg「バイエル」	15mg1錠	リバーロキサバント	内	後発品	処		室温
リバクレオナカプセル150mg	150mg1カプセル	パンクレリバーゼ	内	先発品	処		室温
リバスターαチバッチ4.5mg	4.5mg1粒	リバスターαチバッチ	外	先発品	劇処		室温
リバスターαチバッチ9mg	9mg1枚	リバスターαチバッチ	外	先発○	劇処		室温
リビオドール480注10mL	10mL1管	ヨード化ケン油脂肪酸エチルエヌステル	注	処			室温,遮光
リファレンジンカプセル150mg「サンド」	150mg1カプセル	リファレンジン	内	★	処		室温
リフキンマ錠200mg	200mg1錠	リフキンマシミン	内	先発品	処		室温
リブタミ点滴静注350mg	350mg7mL1瓶	セミミブリマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマダルチド(遺伝子組換え)	内	先発品	劇処		室温
リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマグリチド(遺伝子組換え)	内	先発品	劇処		室温
リボトリール細粒0.1%	0.1%1g	クロナゼバム	内	先発品	向処		室温
リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	クロナゼバム	内	先発品	向処		室温
リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	5μg1錠	リマプロストアルファデクス	内	後発品	処		室温
リメタゾン静注2.5mg	2.5mg10mL1管	テキサメタゾンバルミチニン酸エヌステル	注	先発品	劇処		室温
リュープリリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1筒	リュープリリン吉草酸	注	先発品	劇処		室温
リュープリリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg1筒	リュープリリン吉草酸	注	先発○	劇処		室温
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒	リュープロレリン吉草酸	注	後発品	劇処		室温
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒	リュープロレリン吉草酸	注	後発品	劇処		室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
リルゾール錠50mg「ニプロ」	50mg1錠	リルゾール	内	後発品	処		室温
リレンザ	5mg1ブリスター	ザナミビル水和物	外	先発品	処		室温
リンデロン・Vクリーム0.12%	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル	外	準先発			室温
リンデロン・Vローション	0.12%1mL	ベタメタゾン吉草酸エステル	外	準先発			室温
リンデロン・V軟膏0.12%	0.12%1g	ベタメタゾン吉草酸エステル	外	準先発			室温
リンデロジン2mg(0.4%)	2mg1管	ベタメタゾンリシン酸エステルナトリウム	注		処		冷所
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	ベタメタゾンリシン酸エステルナトリウム	外	準先発			室温
リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5モル20mL1管	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナ	注	先発品	処		室温
ルセンティス硝子体内注射キット10mg/mL	0.5mg0.05mL1筒	ラニビズマグ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇処		冷所
ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	1%1g	ルリコナゾール	外	後発品			室温
レキソタミ錠2	2mg1錠	プロマゼバム	内	先発○	向処		室温
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	2.5L1袋	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	2.5L1袋	腹膜透析液	注	先発品	処		室温
レクピオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1筒	イソクリシランナトリウム	注	先発品	処		室温
レケンビ点滴静注200mg	200mg2mL1瓶	レカネマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
レケンビ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶	レカネマブ(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処	生物	冷所
レスタミコーウクリーム1%	1%10g	ジフェニヒドリミン	外				室温
レスタミコーウ錠10mg	10mg1錠	ジフェニヒドラン塩酸塩	内				室温
レスピア静注・経口液60mg	60mg3mL1瓶	無水カフェイン	注	先発品	処		室温
レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	レトロゾール	内	後発品	劇処		室温
レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	レバグリニド	内	後発品	劇処		室温
レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	レバグリニド	内	後発品	劇処		室温
レバミビド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠	レバミビド	内	★			室温
レベタミ注0.2mg	0.2mg1管	ブレノルファン塩酸塩	注	先発○	劇向処		室温
レベチラセタムDS50%「トーワ」	50%1g	レベチラセタム	内	後発品	処		室温
レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg1錠	レベチラセタム	内	後発品	処		室温
レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	500mg5mL1管	レベチラセタム	注	後発品	処		室温
レベミル注 フレックスベン	300単位1キット	インシリヌ デミル(遺伝子組換え)	注	先発品	劇処		冷所
レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	250mg1錠	レボカルニチン	内	後発品	処		室温
レボフロキサン錠250mg「DSEP」	250mg1錠(レボフロキサンシントリウム)	レボフロキサン水和物	内	後発品	処		室温
レボフロキサン錠500mg「DSEP」	500mg1錠(レボフロキサンシントリウム)	レボフロキサン水和物	内	後発品	処		室温
レボフロキサン点眼液0.5%「日医工」	0.5%1mL	レボフロキサン水和物	外	後発品	処		室温
レボフロキサン点眼液1.5%「VTRS」	1.5%1mL	レボフロキサン水和物	外	後発品	処		室温
レボフロキサン点滴静注パック500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット	レボフロキサン水和物	注	後発品	処		室温
レボフロキサン内用液250mg「トーワ」	250mg10mL1包(レボフロキサン)	レボフロキサン水和物	内	後発品	処		室温
レボホリート点滴静注100mg「NPJ」	100mg1瓶	レボホリナートカルシウム	注	★	処		室温
レボホリナート点滴静注25mg「NP」	25mg1瓶	レボホリナートカルシウム	注	★	処		室温
レミカード点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	注	先発○	劇処	生物	冷所
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶	レミフェンタニル塩酸塩	注	後発品	麻劇処		室温
レルベア200エリプタ14吸入用	14吸入1キット	ビランテロール・リフェニル酢酸塩・フルチカロ	外	先発品	処		室温
レンビマカブセル4mg	4mg1カブセル	レンバチニブメシル酸塩	内	先発品	劇処		室温
ロイコポリ注3mg	0.3%1mL1管	ホリナートカルシウム	注		処		室温
ロカイン注1%	1%5mL1管	ロカイン塩酸塩	注		劇処		室温
ロキソプロフェンナ錠60mg「サワイ」	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物	内	後発品			室温
ロクロニウム異化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶	ロクロニウム異化物	注	後発品	毒処		室温
ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物	内	先発品	処		室温
ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	外	先発品			室温
ロサルタンK錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ロサルタンカリウム	内	後発品	処		室温
ロスマストンOD錠2.5mg「三和」	2.5mg1錠	ロスマストンカルシウム	内	後発品	処		室温
ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	注	後発品	毒処		冷所
ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ビノレルビン酒石酸塩	注	後発品	毒処		冷所
ロドビン錠50mg	50mg1錠	ゾテビン	内	先発品	劇処		室温
ロナセト錠4mg	4mg1錠	プロナンセリン	内	先発○	劇処		室温
ロビオン静注50mg	50mg5mL1管	フルビプロフェンアキセチル	注	先発品	劇処		室温
ロビニール徐放錠2mg「トーワ」	2mg1錠	ロビニール塩酸塩	内	後発品	劇処		室温
ロビニール徐放錠8mg「トーワ」	8mg1錠	ロビニール塩酸塩	内	後発品	劇処		室温
ロフラゼン酸エチル錠1mg「トーワ」	1mg1錠	ロフラゼン酸エチル	内	後発品	向処		室温
ロペミンカブセル1mg	1mg1カブセル	ロペラミド塩酸塩	内	先発品			室温
ロペミン細粒0.1%	0.1%1g	ロペラミド塩酸塩	内	先発品			室温
ロラゼバム錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	ロラゼバム	内	後発品	向処		室温
ロラタジンOD錠10mg「VTRS」	10mg1錠	ロラタジン	内	後発品			室温
ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	ワーファリンカリウム	内		処		室温
ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワーファリンカリウム	内		処		室温
ワーファリン顆粒0.2%	0.2%1g	ワーファリンカリウム	内		処		室温
ワイドリン顆粒20%	200mg1g	アモキシリン水和物	内	後発品	処		室温
ワゴスチグミン注2mg	0.05%4mL1管	ネオスチグミンメチル硫酸塩	注		劇処		室温
ワントラム錠100mg	100mg1錠	トラマドール塩酸塩	内	先発品	劇処		室温
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	4%1mL1管	エフェドリン塩酸塩	注		劇処		室温
垂鉛華(10%)単軟膏「シダ」	10g	垂鉛華單	外	後発品			室温
垂鉛華デンブン「コザカイ・M」	10g	垂鉛華デンブン	外				室温
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	20mg1錠	一硝酸イソソルビド	内	後発品	処		室温
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶	精製ツベルクリン	注		劇処	生物	冷所
液状フェニール「ケンエー」	10mL	液状フェノール	外		劇		室温
塩化カリウム徐放錠600mg「STJ」	600mg1錠	塩化カリウム	内	後発品			室温
塩化ナトリウム「オース」	10g	塩化ナトリウム	外				室温
乾燥B C G ウクチン12mg/0.15mL【冷所】	F002258	乾燥BCGウクチン	注		劇処	生物	10°C以下で保存
乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	1,000単位5mL1瓶(溶解液付)	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注	処	特生		冷所
乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	200単位1mL1瓶(溶解液付)	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	注	処	特生		冷所
乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6,000単位1瓶(溶解液付)	乾燥まむしウマ抗毒素	注		劇処	生物	冷所
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン「ジエーピックV」【冷所】	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	注		劇処	生物	10°C以下で保存
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン【冷所】	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	注		劇処	生物	5°C以下で保存
乾燥弱毒生水痘ワクチン【冷所】	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥弱毒生水痘ワクチン	注		劇処	生物	5°C以下で保存
乾燥弱毒生風疹ワクチン【冷所】	一人分1瓶(溶解液付)	乾燥弱毒生風疹ワクチン	注		劇処	生物	5°C以下で保存
含嗽用ハチアズ類粒	0.1%1g	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水	外				室温
希塩酸	10mL	希塩酸	内				室温
吸水クリーム「ニッコ」	10g	吸水クリーム	外				室温

採用医薬品集（50音順<数字→アルファベット→あいうえお>）2025.12更新

規制区分：麻（麻薬）、毒（毒薬）、劇（劇薬）、向（向精神薬）、処（処方せん薬品） 先発・後発：★（後発品除外品目）、先発○：後発品のある先発品

医薬品名	規格単位	成分名	投与区分	先発・後発	規制区分	生物由来	保存条件
球形吸着炭粒「マイラン」	1g	球形吸着炭	内	後発品			室温
強力ポスティザン(軟膏)	1g	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	外				室温
強力レステミンコーチゾンコーウ軟膏	1g	ヒドロコルチゾン・酢酸エステル・ラジオマイ	外				室温
献血グローベニン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	乾燥ボリエチレンクリコール処理人免疫グロブリン	注	処	特生	30°C以下	
献血ベニロン-I静注用2500mg	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注	処	特生	30°C以下	
献血ベニロン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注	処	特生	30°C以下	
献血ベニロン-I静注用500mg	500mg10mL1瓶(溶解液付)	乾燥スルホ化人免疫グロブリン	注	処	特生	30°C以下	
光糖液5%	5%100mL1瓶	ブドウ糖	注		処		室温
光糖液5%	5%50mL1瓶	ブドウ糖	注		処		室温
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍1瓶(溶解液付)	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	注		特生		冷所
産婦人科用ソジンクリーム5%	5%10g	ボビドショード	外				室温
酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	330mg1錠	酸化マグネシウム	内	後発品			室温
重カマ「ヨシダ」	10g	酸化マグネシウム	内				室温, 気密
消毒用エタプロコール	10mL	消毒用エタノール	外	後発品			室温
硝酸イソルビドテープ40mg「EMEC」	40mg1枚	硝酸イソルビド	外	後発品	処		室温
硝酸イソルビド注5mg/10mL「タカタ」	0.05%10mL1管	硝酸イソルビド	注	★	処		室温
新レシカルボン坐剤	1個	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	外				冷所
人工涙液マイティ点眼液	5mL1瓶	ホウ酸・無機塩類配合剤	外				室温
酢酸亜鉛錠25mg「サワイ」	25mg1錠	酢酸亜鉛水和物	内	後発品	劇処		室温
水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg2mL1瓶	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム	注	先発○	処		室温
水溶性ブレドニン10mg	10mg1管	ブレドニゾロコハク酸エステルナトリウム	注		処		室温
水溶性ブレドニン20mg	20mg1管	ブレドニゾロコハク酸エステルナトリウム	注		処		室温
生食注シリジン「オーツカ」10mL	10mL1筒	生理食塩液	注	処			室温
生理食塩液「カカリ」	100mL1瓶	生理食塩液	注	処			室温
生理食塩液「ヒカリ」	1L1瓶	生理食塩液	注	処			室温
生理食塩液「カカリ」	50mL1瓶	生理食塩液	注	処			室温
生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	生理食塩液	注	処			室温
生理食塩液バグ「フソー」	1L1袋	生理食塩液	注	処			室温
静注用キロカイン2%	2%5mL1管	リドカイン	注		劇処		室温
大塚塩カルカ2%	2%20mL1管	堿化カルシウム水和物	注	処			室温
大塚蒸留水	20mL1管	注射用水	注	処			室温
大塚蒸留水	100mL1瓶	注射用水	注	処			室温
大塚蒸留水	500mL1瓶	注射用水	注	処			室温
大塚食塩液10%	10%20mL1管	堿化ナトリウム	注	処			室温
大塚生食注	20mL1管	生理食塩液	注	処			室温
大塚生食注	500mL1瓶	生理食塩液	注	処			室温
大塚生食注	250mL1袋	生理食塩液	注	処			室温
大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	生理食塩液	注	処			室温
大塚生食注2ポート50mL	50mL1キット	生理食塩液	注	処			室温
大塚糖液10%	10%500mL1袋	ブドウ糖	注	処			室温
大塚糖液20%	20%20mL1管	ブドウ糖	注	処			室温
大塚糖液5%	5%20mL1管	ブドウ糖	注	処			室温
大塚糖液5%	5%250mL1袋	ブドウ糖	注	処			室温
大塚糖液5%	5%500mL1袋	ブドウ糖	注	処			室温
大塚糖液50%	50%20mL1管	ブドウ糖	注	処			室温
大塚糖液50%	50%500mL1袋	ブドウ糖	注	処			室温
単シリップ	10mL	単シリップ	内				室温
炭酸リチウム錠100mg「大正」	100mg1錠	炭酸リチウム	内	★	劇処		室温
炭酸水素ナトリウム「フソー」	10g	炭酸水素ナトリウム	内				室温
注射用GHRP科研100	100μg1瓶	ブラモレリン塩酸塩	注	先発品	処		凍結を避け、10°C以下で保存
注射用イオマイド1g	1g1瓶	イオスマミド	注	先発品	劇処		室温
注射用エラスボール100	100mg1瓶	シペレスタットナトリウム水和物	注	先発○	処		室温
注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	シクロホスマミド水和物	注		劇処		冷所
注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	シクロホスマミド水和物	注		劇処		冷所
注射用ヘンシリングカリウム100万単位	100万単位1瓶	ベンジルペニシリンカリウム	注	処			室温
注射用メトトレキセート50mg	50mg1瓶	メトトレキセート	注	先発品	劇処		室温
注射用メトトレキセート5mg	5mg1瓶	メトトレキセート	注	先発品	劇処		室温
調剤用パンビタン末	1g	レチノール・カルシフェロール配合剤	内				室温
沈降精製日せきジテリア破傷風混合[冷所]	0.5mL1瓶	沈降精製日せきジテリア破傷風混合ワクチン	注		劇処	生物	凍結を避け、10°C以下で保存
沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」	250mg1錠	沈降炭酸カルシウム	内	後発品			室温
沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1瓶	沈降破傷風トキソイド	注		劇処	生物	凍結を避け、10°C以下で保存
低分子デキストランL注	250mL1袋	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	注	先発品	処		室温
動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	シスプラチン	注	先発品	毒処		室温
日点アトロビン点眼液1%	1%5mL1瓶	アトロビン硫酸塩水和物	外		劇		室温
乳酸カルシウム「VTRS」原末	10g	乳酸カルシウム水和物	内				室温
乳酸ビペリデン注5mg「ヨシミ」	0.5%1mL1管	乳酸ビペリデン	注	後発品	劇処		室温
乳糖水和物「ホエイ」	10g	乳糖水和物	内				室温
尿素クリーム20%「SUN」	20%1g	尿素	外	後発品			室温
無水エタノール「ヨシダ」	10mL	無水エタノール	外				室温
無水エタノール注「V T R S」 5 mL	5mL1管	無水エタノール	注	処			室温
薬用炭「白木工」	1g	薬用炭	内				室温
流動バラフィン「ケンエー」	10mL	流動バラフィン	外				室温
硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5モル20mL1管	硫酸マグネシウム水和物	注	処			室温